

Deschampsia cespitosae-Oenanthe peucedanifoliae B. Foucault 1986

		1496	1497	14801	296210	335311	340313	340333	340699	564201	654224	654246	658042	SYNTHÈSE
Numéro relevé		1496	1497	14801	296210	335311	340313	340333	340699	564201	654224	654246	658042	SYNTHÈSE
Altitude (m)		1 130	1 050	1 180	1 050	1 015	1 025	970	1 040	1 125	1 151	1 045	1 015	1 066
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition														
Surface (m²)		nd	nd	nd	250	150	500	100	50	30	20	10	20	126
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	100	100	nd	95	95	100	95	95	100	98
Nombre de taxons		25	31	36	41	41	24	34	37	35	23	22	26	31
Combinaison caractéristique														
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.		2	2	1	1,1	3,3	1,1	2,2	2,2	2	+	1,1	3	V ⁺³
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich		2	2	1	2,2	+	2,2	2,2	2,2	2	1,1	.	1	V ⁺²
<i>Myosotis scorpioides</i> L.		1	2	2	+	+	1,1 cf	2,2	1,1	+	.	.	2	IV ⁺²
<i>Carex panicea</i> L.		+	1	1	+	2,2	2,2	2,2	1,1	2	.	.	.	IV ⁺²
<i>Bromus racemosus</i> L.		2	2	1	.	.	+	2	1,1	1	1,1	.	.	III ⁺²
M	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	.	.	1	.	.	1,1	+	+	2	1	.	.	II ⁺¹
M	<i>Ferula sibirica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	+	.	I ⁺¹
Espèces des milieux humides, très maigres à maigres														
<i>Agrostis canina</i> L.		.	+	.	1,2	2,2	.	1,2	+	2	.	.	.	III ⁺²
<i>Valeriana dioica</i> L.		.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	II ⁺
<i>Galium uliginosum</i> L.		.	.	1	.	r	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
<i>Equisetum palustre</i> L.		.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Carex echinata</i> Murray		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles														
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.		2	2	4	1,2	1,2	.	1,2	1	.	.	.	+	IV ⁺⁴
<i>Juncus conglomeratus</i> L.		.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	2	I ⁺²
<i>Mentha arvensis</i> L.		.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Carex disticha</i> Huds.		.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	I ⁺
<i>Trochodaris verticillatum</i> (L.) Raf.		.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles														
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.		.	+	+	i	+	+	+	.	.	.	.	1	III ⁺¹
<i>Ranunculus flammula</i> L.		.	2	+	+	+	+	r	.	+	.	.	.	III ⁺²
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.		2	1	.	.	+	.	.	1,2	+	.	.	.	II ⁺²
<i>Galium palustre</i> L.		.	1 cf	.	r cf	.	.	.	.	.	.	.	2	II ⁺²
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles														
<i>Caltha palustris</i> L.		1	1	.	2,2	.	1,1	+	2,2	1	.	.	.	III ⁺²
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	2	II ⁺²
<i>Juncus effusus</i> L.		.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		.	.	.	.	.	.	.	.	1	1,1	.	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres														
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.		.	+	.	+	.	1,1	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
<i>Succisa pratensis</i> Moench		.	.	.	r	.	.	+	2	.	.	.	.	I ⁺
<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles														
<i>Ranunculus repens</i> L.		3	.	1	.	1,2	+	2,2	1,2	+	1,1	.	.	IV ⁺³
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	.	2	.	+	.	.	r,2	1,2	.	1,1	1,1	.	III ⁺²
<i>Agrostis stolonifera</i> L.		1	2	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	II ⁺²
<i>Achillea ptarmica</i> L.		.	.	.	2,3	+	2	.	.	.	.	.	.	I ⁺²
<i>Carex hirta</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹
<i>Achillea ptarmica</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
M	<i>Geum rivale</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles														
<i>Carex leporina</i> L.		1	2	1	2,2	2,2	+	1,1	1,1	+	.	.	1	IV ⁺²
<i>Scorzonera humilis</i> L.		+	1	2	2,2	r,2	1,2	2,2	1,1	1	.	.	.	IV ⁺²
<i>Ajuga reptans</i> L.		.	.	.	1,1	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺¹
M	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	.	.	.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à humides fertiles														
<i>Poa trivialis</i> L.		1	1	.	+	1,1	.	1,1	1,1	1	2,2	.	.	IV ⁺²
<i>Alopecurus pratensis</i> L.		2	.	.	+	2	.	2,2	1,2	.	1,1	.	.	III ⁺²
<i>Poa trivialis</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
<i>Urtica dioica</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Rumex crispus</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
M	<i>Trollius europaeus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles														
<i>Briza media</i> L.		.	+	2	.	.	.	r	.	+	.	.	.	II ⁺²
<i>Nardus stricta</i> L.		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.		.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.		.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles														
<i>Rhinanthus minor</i> L.		2	1	2	.	.	.	.	.	1	.	+	.	II ⁺²
<i>Saxifraga granulata</i> L.		.	.	.	1,2	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹

Numéro relevé	1496	1497	14801	296210	335311	340313	340333	340699	564201	654224	654246	658042	SYNTHESE
Altitude (m)	1 130	1 050	1 180	1 050	1 015	1 025	970	1 040	1 125	1 151	1 045	1 015	1 066
Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition													
Surface (m²)	nd	nd	nd	250	150	500	100	50	30	20	10	20	126
Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	100	100	nd	95	95	100	95	95	100	98
Nombre de taxons	25	31	36	41	41	24	34	37	35	23	22	26	31

<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles													
<i>Euphrasia officinalis</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
F <i>Vicia cracca</i> L.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles													
<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	2	+	.	r,2	.	.	r,2	.	.	.	.	II ^{r-2}
F <i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	I ²
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles													
<i>Festuca rubra</i> L.	.	.	2	1,1	+	2,2	1,1	.	.	.	1,1	.	III ⁺²
<i>Stellaria graminea</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles													
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	.	.	.	+	.	.	.	1,2	2	2,2	2,2	.	II ⁺²
P <i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench	.	1	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	II ⁺¹
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles													
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	+	.	2	+	r	+	1,1	+	+	.	.	.	IV ^{r-2}
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	.	+	.	+	+	1,1	1,1	1,1	.	.	.	.	III ⁺¹
<i>Cardamine pratensis</i> L.	+	.	1	+	.	1,1	+	+	1	.	.	.	III ⁺¹
Espèces à large amplitude													
<i>Holcus lanatus</i> L.	3	.	2	2,2	1,1	1,1	+	1,1	2	2,2	2,2	2	V ⁺³
P <i>Cynosurus cristatus</i> L.	2	2	2	1,1	2,2	.	1,1	.	2	2,2	.	.	IV ¹⁻²
<i>Ranunculus acris</i> L.	1	1	2	2,2	1,1	1,1	+	2,2	2	1,1	.	.	IV ⁺²
<i>Trifolium repens</i> L.	3	2	3	.	2,2	.	+	3,3	1	2,2	1,1	.	IV ⁺³
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	2	2	2	1,1	i	1,1	.	1,1	2	1,1	1,1	.	IV ⁺²
<i>Trifolium pratense</i> L.	+	1	1	+	.	.	i	1,1	1	r	1,1	.	IV ^{r-1}
F <i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	.	+	+	.	r	.	+	+	1,1	r	III ^{r-1}
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	+	.	1	+	r	.	.	+	+	.	1,1	.	III ^{r-1}
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	+	.	.	r	+	.	.	.	.	II ^{r-4}
<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	.	1,1	r	.	.	r	.	.	+	.	II ^{r-1}
P <i>Lolium perenne</i> L.	.	.	.	.	r	.	.	+	.	1,1	.	.	II ^{r-1}
F <i>Phleum pratense</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	+	2	.	1,1	.	II ⁺¹
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	1,1	+2	1,1	1,1	.	.	.	.	II ⁺¹
<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	.	.	1,1	+	.	.	+	2	.	.	.	II ⁺¹
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	1,1	.	II ⁺¹
<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	1	I ¹
<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
<i>Galium aparine</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
Autres taxons													
M <i>Juncus filiformis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
<i>Galium boreale</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	I ²
<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M <i>Trifolium spadiceum</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Salix</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Dactylorhiza</i> Neck. ex Nevski	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Trifolium</i> L.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Alchemilla</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces annuelles													
<i>Veronica arvensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
<i>Ervilla hirsuta</i> (L.) Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I ^r