

Jacobaeae aquaticae-Oenantheum silaifoliae

Bourn. & Géhu in Bourn., Delpech, Dorigny, Géhu, Lecointe, Maucorps, Provost, Solau, Tombal & Wattez 1978 *nom. corr.* (art. 44)

		364259	394627	394629	636618	SYNTHESE
Numéro relevé		170	169	170	nd	170
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd
Pente relevé (°)						
Exposition		30	40	50	15	34
Surface (m²)		100	100	100	100	100
Recouvrement total (%)		29	27	23	29	27
Nombre de taxons						
Combinaison caractéristique						
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.		.	.	.	1,1	II ¹
Oenanthe silaifolia M.Bieb.		.	.	.	1,2	II ¹
C	Hordeum secalinum Schreb.	2,2	2,2	2,2	2,2	V ²
	Bromus racemosus L.	.	2,2	2,2	1,1	IV ¹⁻²
Ci	Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.	1,1	1,2	.	1,1	IV ¹
	Fritillaria meleagris L.	.	.	.	1,1	II ¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles						
C	Oenanthe fistulosa L.	.	.	.	1,2	II ¹
	Lotus pedunculatus Cav.	.	.	.	2,2	II ²
	Carex disticha Huds.	.	i	.	.	II ¹
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles						
Ranunculus repens L.		.	2,2	.	1,1	III ¹⁻²
Agrostis stolonifera L.		.	2,2	2,2	.	III ²
Achillea ptarmica L.		.	1,2	.	.	II ¹
Carex hirta L.		.	1,1	.	.	II ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles						
C	Potentilla reptans L.	2,2	2,2	1,1	.	IV ¹⁻²
	Cardamine pratensis L.	.	.	.	1,2	II ¹
	Lychnis flos-cuculi L.	.	.	.	+	II ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles						
Lysimachia nummularia L.		.	1,1	.	.	II ¹
C	Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	.	1,1	II ¹
	Trifolium fragiferum L.	.	.	.	2,3	II ²
Espèces des milieux sains à humides fertiles						
Rumex crispus L.		r	+	r	.	IV ¹⁻²
Poa trivialis L.		1,1	1,1	1,1	.	IV ¹
Cirsium arvense (L.) Scop.		+	r	.	.	III ¹⁻²
Alopecurus pratensis L.		.	.	.	1,2	II ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles						
Centaurea jacea L.		1,1	2,2	.	.	III ¹⁻²
Centaurea decipiens Thuill.		.	.	.	1,1	II ¹
Leucanthemum ircutianum DC.		+	.	.	.	II ¹
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles						
P	Scorzonoides autumnalis (L.) Moench	.	.	.	+	II ¹
	Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.	.	1,2	.	.	II ¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles						
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski		.	1,1	.	+	III ¹⁻²
F	Vicia cracca L.	.	.	1,2	+2	III ¹⁻²
	Vicia gr. sativa	+	.	.	.	II ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles						
Ranunculus bulbosus L.		+	.	r	.	III ¹⁻²
Lotus corniculatus L.		1,1	2,2	.	.	III ¹⁻²
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles						
Galium verum L.		1,1	1,2	2,2	.	IV ¹⁻²
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.		+	.	.	.	II ¹
Verbena officinalis L.		r	.	.	.	II ¹
Espèces à large amplitude						
P	Lolium perenne L.	3,3	2,2	1,1	1,1	V ¹⁻³
	Plantago lanceolata L.	1,1	1,1	1,1	1,2	V ¹
Convolvulus arvensis L.		+	+	2,2	.	IV ¹⁻²
Ranunculus acris L.		2,2	.	+	2,2	IV ¹⁻²
Trifolium pratense L.		1,1	.	1,1	1,2	IV ¹
Trifolium repens L.		3,3	.	.	2,2	III ²⁻³
Taraxacum sect. Taraxacum		2,2	.	.	+	III ¹⁻²
Poa pratensis L.		+	1,1	.	.	III ¹⁻²
Anthoxanthum odoratum L.		.	+2	.	2,2	III ¹⁻²
P++	Bellis perennis L.	+	.	.	1,2	III ¹⁻²
	Phleum pratense L.	.	1,2	1,2	.	III ¹
F	Dactylis glomerata L.	+	.	.	.	II ¹
	Agrostis capillaris L.	1,1	.	.	.	II ¹
Holcus lanatus L.		.	.	.	1,1	II ¹
F	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	.	.	2,3	.	II ²
	Dactylis glomerata L.	.	.	1,2	.	II ¹
Daucus carota L.		+	.	.	.	II ¹
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.		2,2	.	.	.	II ²
F	Tragopogon pratensis L.	.	.	1,1	.	II ¹
Autres taxons						
Sonchus asper (L.) Hill		.	.	i	.	II ¹
Stachys palustris L.		.	+	.	.	II ¹
Alopecurus bulbosus Gouan		.	.	.	2,2	II ²
Thalictrum flavum L.		.	.	1,1	.	II ¹
Leontodon saxatilis Lam.		.	.	.	+	II ¹
Euphorbia esula L.		.	.	r	.	II ¹
Espèces annuelles						
Geranium dissectum L.		.	i	i	.	III ¹
Genres						
Crepis L.		+	.	.	.	II ¹
Bromus L.		1,1	.	.	.	II ¹
Taraxacum F.H.Wigg.		.	i	i	.	III ¹