

		222754	222755	222761	385319	385324	385328	385330	385333	385336	385337	385338	SYNTHESE
Numéro relevé		800	760	640	930	815	840	810	900	915	960	820	835
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nombre de taxons		18	14	12	17	10	19	18	18	19	12	15	16
Combinaison caractéristique													
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	1	2,3	1	1,2	2,3	1	3	4	.	1	1	V ¹⁻⁴
	<i>Carex hirta</i> L.	2	1,2	1,2	1	1,2	1,2	+	1,2	1,2	1	1	V ⁺²
	<i>Rumex crispus</i> L.	1	1,2	+	+	1	+	+	.	+	.	.	IV ⁺¹
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1	.	.	.	1	1,2	+	.	.	.	1	III ⁺¹
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	1,2	+	.	.	.	1	II ⁺¹
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles													
C	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	1	1	.	1,2	.	.	.	.	1	2	1,2	III ¹⁻²
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	2	.	.	1	1	1,2	.	II ¹⁻²
	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles													
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	1	2	.	.	.	.	.	.	+	.	.	II ⁺²
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	I ²
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles													
	<i>Ranunculus repens</i> L.	1,2	+	2	2	.	1	1	3	2	1	1,2	V ⁺³
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	1,2	1,2	1	3	1,2	1,2	3	1,2	1	1	2	V ¹⁻³
	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	1	II ¹
	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles													
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	1	1,2	2	1	1,2	2	1	.	.	.	.	III ¹⁻²
C	<i>Juncus articulatus</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	II ¹⁻²
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à humides fertiles													
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	.	.	1	.	.	1	+	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Carex spicata</i> Huds.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles													
	<i>Stellaria graminea</i> L.	+	+	+	.	.	1	.	+	.	.	.	III ⁺¹
	<i>Equisetum arvense</i> L.	1	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	1	II ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles													
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	1	1	II ⁺¹
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	1	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles													
	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
Espèces à large amplitude													
	<i>Holcus lanatus</i> L.	1	1	1	1	.	1,2	1	1,2	1	1	1	V ¹
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	1	.	1	1	1	1	1,2	1	III ¹
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	1	1	.	.	1	+	1	1	.	.	III ⁺¹
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	.	.	.	2	+	+	.	.	.	II ⁺²
P+	<i>Plantago major</i> L.	.	.	.	.	.	+	2	1	.	.	.	II ⁺²
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	I ⁺¹
P	<i>Lolium perenne</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	I ¹
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Autres taxons													
	<i>Ervum gracile</i> (Lois.) DC.	1	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	II ⁺¹
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Veronica beccabunga</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	I ³
Espèces annuelles													
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹