

	222402	222403	222404	222428	303718	383660	383662	383657	222426	383668	SYNTHESE
Numéro relevé											
Altitude (m)	350	360	350	840	595	310	490	640	550	790	528
Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition											
Surface (m²)	nd	nd	nd	nd	150	nd	nd	nd	nd	nd	150
Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	nd	100	nd	nd	nd	nd	nd	100
Nombre de taxons	45	29	39	37	37	29	31	22	37	28	33
Combinaison caractéristique											
<i>Agrostis capillaris</i> L.	1	+	1	1,2	2,2	.	1	1,2	+	1	V ⁺²
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	+	+	1	+	i	1	+	+	+	1	V ⁺¹
<i>Scorzonera humilis</i> L.	+	1	1	1,2	1,3	+	.	1,2	.	1	IV ⁺¹
<i>Bromus racemosus</i> L.	+	1	1	.	.	+	+	.	1	.	III ⁺¹
<i>Carex panicea</i> L.	+	+	1	1	.	1	.	1	.	.	III ⁺¹
<i>Carex leporina</i> L.	+	.	.	1	1,2	.	.	1	+	+	III ⁺¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles											
<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf.	+	+	.	1	1,1	.	.	1	.	.	III ⁺¹
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	+	.	1	.	.	+	.	.	1	II ⁺¹
<i>Carex disticha</i> Huds.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles											
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	.	+	+	.	.	+	+	.	+	+	III ⁺
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	+	.	+	1	.	.	.	1	.	.	II ⁺¹
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	1	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^{r-1}
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles											
<i>Betonica officinalis</i> L.	1	1	.	.	+,1	.	+	.	.	.	II ⁺¹
<i>Carex flacca</i> Schreb.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles											
<i>Centaurea jacea</i> L.	1	1	1	.	1,3 cf	.	+	.	.	.	III ⁺¹
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	+	+	+	.	+,2	.	.	.	.	.	II ⁺
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles											
<i>Stellaria graminea</i> L.	1	1	+	+	+,2	1	+	+	+	.	V ⁺¹
<i>Festuca rubra</i> L.	1	.	1	1	2,2 cf	2	.	1,2	+	1	IV ⁺²
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	1	+,2	+	.	.	.	+	II ⁺¹
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles											
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	1,2	2	.	1	.	.	2	1	+	.	III ⁺²
F <i>Heracleum sphondylium</i> L.	.	.	.	1	r	.	.	.	.	.	I ^{r-1}
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à humides fertiles											
<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	1	.	2,3	.	1	.	.	1	II ¹⁻²
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	.	.	.	+	.	.	+	.	II ⁺
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	.	.	.	.	+,1	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres											
<i>Carex pallescens</i> L.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺
<i>Succisa pratensis</i> Moench	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles											
<i>Ajuga reptans</i> L.	+	.	+	1	+,2	.	1	.	1	+	IV ⁺¹
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	.	.	.	.	.	1	+	.	.	+	II ⁺¹
<i>Cardamine pratensis</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
C <i>Potentilla reptans</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Achillea ptarmica</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres											
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	.	.	.	+,2	.	.	.	.	.	I ⁺¹
Ci <i>Galium album</i> Mill.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles											
<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	.	+	1	.	+	+	.	+	1	IV ⁺¹
<i>Leontodon hispidus</i> L.	.	.	.	1	+,2	.	+	.	+	+	III ⁺¹
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles											
<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	.	1	1	.	1	.	1	+	1	IV ⁺¹
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	1	1	.	.	1,2	.	.	.	1	.	II ¹

Numéro relevé		222402	222403	222404	222428	303718	383660	383662	383657	222426	383668	SYNTHESE
Altitude (m)		350	360	350	840	595	310	490	640	550	790	528
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition												
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	150	nd	nd	nd	nd	nd	150
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	100	nd	nd	nd	nd	nd	100
Nombre de taxons		45	29	39	37	37	29	31	22	37	28	33
<i>Primula veris</i> L.		+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Galium verum</i> L.		1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles												
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.		+	.	+	+	+1	.	+	+	+	+	IV ⁺
<i>Briza media</i> L.		1	.	1	1	.	1	1	1	.	.	III ¹
<i>Nardus stricta</i> L.		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺⁺¹
Espèces à large amplitude												
<i>Ranunculus acris</i> L.		1	1	1,2	1	+2	1	1	1,2	1	1	V ⁺⁺¹
<i>Plantago lanceolata</i> L.		1	1	1	1	+2	+	1	+	1	1	V ⁺⁺¹
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		+	+	2	+	+1	1	+	+	+	1	V ⁺⁺²
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		1,2	1	1,2	1,2	2,2	1	1	1,2	+	.	V ¹⁻²
P <i>Cynosurus cristatus</i> L.		1	+	1	1	2,2	1,2	+	.	+	2	V ⁺⁺²
<i>Rumex acetosa</i> L.		+	1	.	1	1,2	1	+	1	+	1	V ⁺⁺¹
<i>Holcus lanatus</i> L.		2	1,2	1	1	3,3	1,2	.	.	2	1	IV ¹⁻³
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.		+	+	+	.	1,1	.	2	1	+	.	IV ⁺⁺²
<i>Trifolium pratense</i> L.		.	.	.	1	+2	1	1	1	1	1	IV ⁺⁺¹
F <i>Lathyrus pratensis</i> L.		.	1	1	.	.	1	1	.	+	1	III ⁺⁺¹
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>		+	.	1	1	+2	.	.	.	+	.	III ⁺⁺¹
<i>Dactylis glomerata</i> L.		+	+	.	1	.	1	.	.	.	+	III ⁺⁺¹
P <i>Lolium perenne</i> L.		.	.	+	1	2,2	.	+	.	+	.	III ⁺⁺²
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		+	1	.	.	1,2	+	.	.	.	.	II ⁺⁺¹
<i>Trifolium repens</i> L.		.	.	.	1	1,3	.	3	.	.	.	II ¹⁻³
P++ <i>Bellis perennis</i> L.		.	.	+	1	.	.	.	.	+	.	II ⁺⁺¹
F <i>Phleum pratense</i> L.		.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	I ¹
<i>Poa pratensis</i> L.		.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	I ¹
<i>Achillea millefolium</i> L.		.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^r
Espèces compagnes												
<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West		.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	II ¹
<i>Carex spicata</i> Huds.		.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Ervillea hirsuta</i> (L.) Opiz		+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Veronica arvensis</i> L.		.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach		.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Juncus conglomeratus</i> L.		.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.		+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
C <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.		+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
F <i>Vicia cracca</i> L.		1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺