

Eleocharito palustris*-*Oenanthetum fistulosae B. Foucault 2008

		650607	385484	385487	640572	640574	640594	640626	640696	640605	650614	SYNTHESE
Numéro relevé												
Altitude (m)		nd	540	570	131	130	129	134	134	364	nd	267
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition												
Surface (m²)		2	nd	nd	15	12	12	12	15	10	1	10
Recouvrement total (%)		85	nd	nd	95	95	100	100	100	90	75	93
Nombre de taxons		21	20	19	22	22	22	27	24	18	17	21
Combinaison caractéristique												
C	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	2,2	1	1,2	3	3	1	2	3	2	2,2	V ¹⁻³
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	4,3	2	1	2	1	.	1	1	1	2,2	IV ¹⁻⁴
C	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray	.	.	1	.	.	+	.	.	+	1,1	II ⁺¹
	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	.	1	.	.	1	.	.	.	4	+	II ⁺⁴
	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	.	1	.	+	.	1	.	2	.	.	II ⁺²
Espèces des milieux sains à humides fertiles												
	<i>Poa trivialis</i> L.	2,2	.	.	1	1	.	1	2	2	+	IV ⁺²
	<i>Rumex crispus</i> L.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	+	II ⁺¹
	<i>Convolvulus sepium</i> L.	.	.	.	.	2	.	3	3	.	.	II ²⁻³
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	.	.	.	.	+	1	.	.	+	.	II ⁺¹
Espèces des milieux humides, très maigres à maigres												
	<i>Equisetum palustre</i> L.	.	.	.	.	1	+	.	+	.	+	II ⁺¹
	<i>Agrostis canina</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	I ¹⁻²
Cs	<i>Comarum palustre</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles												
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	1,2	1,2	3	2	2	3	3	2	.	.	IV ¹⁻³
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	.	2	1	.	.	.	1	.	.	.	II ¹⁻²
	<i>Carex disticha</i> Huds.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2,2	I ¹⁻²
	<i>Carex vesicaria</i> L.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	I ¹⁻²
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles												
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	1,2	1	1	.	.	1	2	.	2	+	IV ⁺²
	<i>Galium palustre</i> L.	2,3	1 cf	1 cf	.	2	.	.	.	+	1,2	III ⁺²
	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	II ¹
	<i>Carex elata</i> All.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles												
C	<i>Carex otrubae</i> Podp.	.	.	.	1	2	2	1	2	+	.	III ⁺²
	<i>Mentha aquatica</i> L.	+	2	1	1	.	.	2	.	1	.	III ⁺²
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	1	+	.	II ⁺¹
	<i>Iris pseudacorus</i> L.	.	.	1	+	.	.	.	1	.	.	II ⁺¹
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	I ¹⁻²
	<i>Caltha palustris</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	I ¹
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Lycopus europaeus</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles												
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	+	.	.	1	1	1	1	.	.	.	III ⁺¹
	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	II ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles												
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	.	.	.	2	2	1	2	2	.	.	III ¹⁻²
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	+	.	1	.	+	.	1	.	.	.	II ⁺¹

		650607	385484	385487	640572	640574	640594	640626	640696	640605	650614	SYNTHESE
Numéro relevé												
Altitude (m)		nd	540	570	131	130	129	134	134	364	nd	267
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition												
Surface (m²)		2	nd	nd	15	12	12	12	15	10	1	10
Recouvrement total (%)		85	nd	nd	95	95	100	100	100	90	75	93
Nombre de taxons		21	20	19	22	22	22	27	24	18	17	21
C	<i>Juncus articulatus</i> L.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	1,2	II ¹
	<i>Cardamine pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles												
	<i>Ranunculus repens</i> L.	2,2	1,2	1,2	2	3	2	2	2	2	1,2	V ¹⁻³
	<i>Carex hirta</i> L.	.	1	.	1	1	3	2	3	.	+	IV ¹⁻³
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	2,3	.	1	2	2	3	.	2	2	2,3	IV ¹⁻³
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	.	.	.	1	+	.	2	1	.	.	II ¹⁻²
	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces à large amplitude												
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	.	.	.	.	.	1	2	2	.	.	II ¹⁻²
	<i>Holcus lanatus</i> L.	1,2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	II ¹
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium repens</i> L.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
F	<i>Phleum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
Autres taxons												
	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	+	.	.	1	1	.	1	.	+	.	III ¹⁻¹
	<i>Galium elongatum</i> C.Presl	.	.	.	2	.	.	3	1	.	.	II ¹⁻³
	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	.	.	.	1	+	+	.	1	.	.	II ¹⁻¹
	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I ¹⁻¹
	<i>Veronica scutellata</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹⁻¹
	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I ¹
	<i>Veronica beccabunga</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Carex acuta</i> L.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	I ²
	<i>Carex vulpina</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	.	1,2	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Linum usitatissimum</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Bromus racemosus</i> L.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Glyceria</i> R.Br.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Juncus</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹