

Molinio arundinaceae-Pulicarietum dysentericae Choynet ass. nov.

		42977	42975	42980	42986	42988	42980	51995	51248	51275	51286	SYNTHESE
Numéro relevé		245	290	245	265	265	265	170	175	195	195	231
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	3	nd	nd	nd	3
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	3	nd	nd	nd	3
Exposition		7	5	3	4	8	3	15	4	6	1	6
Surface (m²)		100	95	80	95	100	80	100	100	100	100	95
Recouvrement total (%)		22	20	12	18	11	15	17	17	21	9	16
Nombre de taxons		22	20	12	18	11	15	17	17	21	9	16
Combinaison caractéristique												
	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	2,2	3,3	4,4	3,4	3,4	2,2	.	+	4,4	3,3	V ⁺⁴
C	<i>Carex distans</i> L.	2,2	.	1,1	2,2	+	2,2	+	1,1	.	.	IV ⁺²
C	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	2,2	1,2	.	.	2,2	1,1	2,2	2,2	1,1	r	IV ⁺²
	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	3,3	2,2	+	1,2	1,1	+	3,3	.	+	2	IV ⁺³
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	1,1	+	.	.	.	.	+	2	.	r	II ⁻¹
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres												
	<i>Lotus maritimus</i> L.	1,2	+	2,2	+	2	.	1,1	+	.	.	IV ⁺²
C	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	r	i	r	r	.	.	.	.	.	.	II ⁻ⁱ
	<i>Carex panicea</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	+	r	.	II ^{r+}
	<i>Equisetum palustre</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles												
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	1,1	2,2	2,2	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	1,1	2,2	V ^{-1,2}
	<i>Linum catharticum</i> L.	.	+	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ⁻¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles												
	<i>Lotus glaber</i> Mill.	.	.	.	+	r	1,1	+	.	+	1,1	IV ⁺¹
C	<i>Juncus articulatus</i> L.	.	r	.	.	r,2	+	+	.	.	.	II ^{r+}
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles												
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	2,2	.	1,1	3,4	+	.	1,1	1,1	.	IV ⁺³
	<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Mentha aquatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles												
	<i>Briza media</i> L.	+	+	2,2	2,2	.	.	.	.	.	.	II ⁻²
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	i	.	.	.	.	.	.	.	i	.	I ⁱ
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	i	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles												
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	I ²
	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Equisetum arvense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	+	.	I ⁺¹
Espèces à large amplitude												
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	2,2	2,2	.	3,3	2,2	3,3	+	.	2,2	.	IV ⁺³
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	+	.	r	.	1,1	.	.	.	.	II ^{r-1}
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	+	.	+	.	.	r	.	II ^{r+}
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	I ²
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	I ⁺
P+	<i>Plantago major</i> L.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
Autres taxons												
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	2,2	.	2,2	.	.	.	.	3,3	r	.	II ^{r-3}
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	+	.	.	.	r	.	.	1,1	+	.	II ^{r-1}
	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	.	.	.	.	.	.	3,3	1,1	3,3	.	II ⁻³
	<i>Lotus hirsutus</i> L.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	I ⁺
	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Poa compressa</i> L.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	.	I ³
	<i>Galium gr. aparine</i>	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ⁱ
	<i>Prunella hyssopifolia</i> L.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
	<i>Tussilago farfara</i> L.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Allium oleraceum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Plantago maritima</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Schoenus nigricans</i> L.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ⁱ
	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	I ²
	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Fraxinus ornus</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Salix purpurea</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	I ³
	<i>Tonilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Lotus dorycnium</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
Genres												
	<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Prunella</i> L.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Carex</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r