Salvio pratensis-Trifolietum molinerii Billy *ex* Thébaud, C. Roux, C.-E. Bernard & Delcoigne 2014

		Numéro relevé	222078	338500	364722	371448	371469	382761	382774	382779	387833	387836	387837	585720	368960	368962	370509	370510	371450	303056	303069	371467	512501	371447	388385	418940	572022	620233	SYNTHESE
		Altitude (m)	660	356	620	215	285	720	855	520	560	590	600	380	580	580	325	310	210	490	490	235	550	205	690	750	750	555	503
		Pente relevé (°)	nd	nd	25	5	2	nd	nd	nd	3	3	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5	nd	nd	nd	nd	7	nd	5	nd	6
		Exposition			SSE	O	O				N	E	E							O	O				SE		NNE		
		Surface (m²)	nd	25	40	40	40	nd	nd	nd	100	100	100	5	100	100	40	40	40	20	nd	30	40	40	100	75	25	100	57
		Recouvrement total (%)	nd	90	100	100	100	nd	nd	nd	99	98	95	100	95	100	100	100	100	90	nd	100	100	100	100	100	80	95	97
		Nombre de taxons	35	29	33	33	36	36	39	23	29	35	28	48	49	48	35	36	32	42	45	49	30	32	45	35	33	38	37
Combinaison caractéristique																													
Ci		*Trifolium incarnatum* var. *molinerii* (Balb. ex Hornem.) DC.	1,2	.	1,1	2,2	2,2	2	1,2	1	1,3	1,2	+	2	3,3	2,2	.	.	2,2	+	1,1	+	1,2	1,1	r	3,4	1,1	1,2	V^{r-3}
		Centaurea jacea L.	1	1,1	+	.	1,1	1	1	+	.	+	+ cf	+	.	.	1,1	1,1	.	.	1,1	1,1	1,1	1,1	+	.	.	.	III^{+-1}
Ci		*Salvia pratensis* L.	1,2	.	2,2	.	.	.	+	1,2	.	.	.	1	i	+	2,2	1,1	2,2	r	i	1,1	2,2	+	1,1	.	.	.	III^{r-2}
		Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	2,2	3,3	2,2	2,2	3,3	.	.	.	.	.	.	.	.	II^{1-3}
	R-	*Armeria arenaria* (Pers.) Schult.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	+	r	.	+	+	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	II^{r-2}
		Trifolium striatum L.	.	2,2	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	3,3	2,2	.	.	.	.	+	1,1	.	.	r	2,2	.	r	II^{r-3}
		Vulpia bromoides (L.) Gray	1	2,2	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	II^{1-2}
Ci		*Galium album* Mill.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
Ci	F	*Crepis vesicaria* L.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,1	1,1	.	.	.	.	.	2,2	.	.	1,1	.	.	II^{r-2}
	F	*Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1,2	.	1,1	2,2	2,2	1	1,2	.	2,2	2,2	1,1	2	2,2	2,3	2,2	1,1	1,1	2,2	+	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,1	1,1	V^{+-2}
		Ranunculus bulbosus L.	+	2,2	1,1	.	+	+	+	1	+	+	+	+	1,1	1,2	1,1	+	1,1	2,2	1,1	1,1	1,1	+	+	1,1	2,2	1,1	V^{+-2}
		Primula veris L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1,1	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
C		*Malva moschata* L.	1	.	i	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	r	.	.	.	1,1	.	.	.	II^{r-1}
		Hypericum perforatum L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	i	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	I^{r-+}
		Festuca rubra L.	.	1,1	2,2 cf	.	.	.	.	1	1,1 cf	2,2 cf	1,1 cf	2	.	.	1,1 cf	3,3 cf	.	1,2 cf	.	1,1 cf	.	.	1,1 cf	+	.	3,3	III^{+-3}
		Helianthemum nummularium (L.) Mill.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	1,2	1,1	.	.	.	.	.	.	I^{+-2}
		Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	r,2	r,2	.	.	2,2	2,2	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	II^{r-2}
		Dianthus carthusianorum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	+,2	.	+	1,1	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I^{i-1}
		Euphorbia cyparissias L.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{1}
		Holcus lanatus L.	1	.	1,1	1,1	1,1	1	.	.	.	1,1	r	.	.	+,2	1,1	1,1	.	1,2	1,1	2,2	2,2	2,2	3,3	2,3	1,1	2,2	IV^{r-3}
		Trifolium repens L.	1	1,1	2,2	.	2,2	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1,1	+	.	.	.	.	2,2	1,1	2,2	+,2	+	+	III^{+-2}
	P	*Lolium perenne* L.	.	.	1,1	.	.	.	1	+	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	1,1	.	1,1	+	3,3	+,1	II^{+-3}
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles																													
		Galium verum L.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	+	+,2	1,2	.	1,1	.	.	.	1,1	.	.	1,2	.	.	.	II^{+-1}
		Chondrilla juncea L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	R-	*Brachypodium rupestre* (Host) Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Rhinanthus minor L.	1	.	.	.	.	1,2	1	1,2	r,3	1,2	+,2	.	+	+,2	.	1,1	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	2,2	III^{r-2}
		Saxifraga granulata L.	1	.	.	.	.	.	.	.	2,2	r	1,1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	II^{r-2}
		Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	.	.	2,2	2,2	2,2	1,2	1	1	.	.	.	.	2,2	2,2	2,2	1,1	2,2	.	+	1,1	1,1	1,1	3,3	2,2	2,2	2,2	IV^{+-3}
		Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	.	.	.	.	.	.	+	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{i-+}
		Luzula campestris (L.) DC.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	+,3	1,1	+	1	.	.	.	1,1	.	2,2	1,1	.	+	.	.	.	.	+,1	II^{+-2}
		Danthonia decumbens (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Briza media L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1,1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles																													
		Leucanthemum gr. *vulgare*	1	2,2	.	.	1,1	.	.	.	.	r	.	+	.	.	+	1,1	+	.	1,2	+	1,1	.	+	+,2	.	1,1	III^{r-2}
C	F	*Knautia arvensis* (L.) Coult.	1	.	1,1	.	.	1	+	.	.	+	+	2	.	+,2	2,2	.	1,1	.	2,2	1,1	1,1	1,1	.	+	.	+	III^{+-2}
	F	*Knautia arvernensis* (Briq.) Szabó	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2,3	+	1,1	I^{r-2}
		Agrimonia eupatoria L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
		Stellaria graminea L.	.	+,1	.	.	.	+	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+,2	.	+	+	II^{+-1}
		Veronica chamaedrys L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	r	.	.	.	.	+,2	.	+	.	I^{r-1}
		Equisetum arvense L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	1
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles																													
		Lotus corniculatus L.	.	2,2	1,1	.	.	1	1	1	+	+	+	+	+	r	.	1,1	+	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	.	.	.	.	IV^{r-2}
		Origanum vulgare L.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Eryngium campestre L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r}
		Carex caryophyllea Latourr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2,3	1,1	.	+	.	.	.	.	.	I^{+-2}
		Pilosella officinarum Vaill., 1754	.	2,2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	+,2	.	.	.	.	1,1	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	II^{+-2}
		Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	$+^{i}$
		Leontodon hispidus L.	1	.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
		Galium pumilum Murray	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	1
		Poa bulbosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+,2	+,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+}
		Muscari comosum (L.) Mill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{i-+}
		Avenula pubescens (Huds.) Dumort.	1	.	+	1,1	1,1	+	1	.	+	r	+	3	.	.	2,2	1,1	1,1	+	.	2,2	3,3	1,1	.	.	.	.	IV^{r-3}
		Crepis capillaris (L.) Wallr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{+}
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres																													
		Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat	.	+,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
C		*Oreoselinum nigrum* Delarbre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Poterium sanguisorba L.	+	.	2,2	1,1	+	+	1	.	+	+	1,1	1	+	r	2,2	1,1	+	1,1	2,2	1,1	2,2	.	2,2	.	.	.	IV^{r-2}
		Pimpinella saxifraga L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	.	$+^{r}$
		Coronilla varia L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Ajuga genevensis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I^{1}
		Rumex acetosella L.	.	1,3	1,1	1,1	.	.	.	.	.	+,2	+	.	.	.	.	.	.	1,1	.	1,1	.	.	.	.	.	.	II^{+-1}
	R-	*Anthyllis vulneraria* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Thymus gr. *pulegioides*	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I^{1-2}
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres																													
		Hippocrepis comosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{1}$
		Potentilla gr. *argentea*	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
		Koeleria gr. *pyramidata*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	1
		Trifolium ochroleucon Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+,2	+,2	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
		Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles																													
		Knautia basaltica Chass. & Szabó	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	1
		Vicia angustifolia L.	.	+,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	+	.	.	.	1,1	.	1,1	.	I^{r-2}
		Vicia gr. *sativa*	1	.	+	.	1,1	.	+	.	.	r	.	.	+	.	1,1	1,1	1,1	.	.	+	.	1,1	.	1,1	.	+	III^{r-1}
		Artemisia vulgaris L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Conopodium majus (Gouan) Loret	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I^{r-+}
	F	*Vicia cracca* L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+,2	.	.	I^{+-1}
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles																													
		Polygala vulgaris L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	1	.	.	.	.	.	+	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
C		*Onobrychis viciifolia* Scop.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Linum catharticum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Ononis spinosa L.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	i	.	1,2	+,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{i-1}
		Carlina vulgaris L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
		Betonica officinalis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles																													
		Vicia segetalis Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	F	*Crepis biennis* L.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
	F	*Heracleum sphondylium* L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1,1	.	+	.	1,1	1,1	II^{+-1}
		Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-2}
		Cruciata laevipes Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+,2	.	.	.	I^{r}
		Vicia sepium L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	I^{r-1}
		Ajuga reptans L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1,1	.	.	+	.	.	.	I^{+-1}
Espèces à large amplitude																													
		Ranunculus acris L.	1	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I^{i-1}

Tableau extrait de : Le Hénaff P.- M., Galliot J.-N, Le Gloanec V., Ragache Q. 2021 - Végétations agropastorales du Massif central - Catalogue phytosociologique. Conservatoire botanique national du Massif central, 528 p.

	Numéro relevé	222078	338500	364722	371448	371469	382761	382774	382779	387833	387836	387837	585720	368960	368962	370509	370510	371450	303056	303069	371467	512301	371447	388385	418940	572022	620233	SYNTHESE
	Altitude (m)	660	356	620	215	285	720	855	520	560	590	600	380	580	580	325	310	210	490	490	235	550	205	690	750	750	555	**503**
	Pente relevé (°)	nd	nd	25	5	2	nd	nd	nd	3	3	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	5	nd	nd	nd	nd	7	nd	5	nd	**6**
	Exposition			SSE	O	O				N	E	E							O	O				SE		NNE		
	Surface (m²)	nd	25	40	40	40	nd	nd	nd	100	100	100	5	100	100	40	40	40	20	nd	30	40	40	100	75	25	100	**57**
	Recouvrement total (%)	nd	90	100	100	100	nd	nd	nd	99	98	95	100	95	100	100	100	100	90	nd	100	100	100	100	100	80	95	**97**
	Nombre de taxons	35	29	33	33	36	36	39	23	29	35	28	48	49	48	35	36	32	42	45	49	30	32	45	35	33	38	**37**
P+	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{1-2}
	Hypochaeris radicata L.	.	1,1	1,1	+	.	.	.	.	+	r	r	+	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	i	r	.	1,1	III^{r-1}
	Anthoxanthum odoratum L.	1	.	1,1	1,1	1,1	.	+	1	3,3	2,2	2,2	.	.	r,2	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	2,2	2,2	1,1	+	1,1	2,2	V^{r-3}
F	*Tragopogon pratensis* L.	.	.	+	.	1,1	+	.	+	.	+	.	r	+	+,2	1,1	+	+	.	.	.	1,1	2,2	i	1,1	1,1	1,1	IV^{r-2}
	Trifolium pratense L.	1,2	.	1,1	.	1,1	+	+	1	.	+	r	.	+,2	.	1,1	1,1	.	1,1	2,2	1,1	.	1,1	1,2	+,2	.	2,2	IV^{r-2}
	Taraxacum sect. *Taraxacum*	.	.	.	.	.	1,2	+	.	+	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1,1	2,2	.	II^{r-2}
P	*Cynosurus cristatus* L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	1,1	r	.	.	I^{r-2}
	Cerastium fontanum Baumg.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	1,1	.	.	.	.	+	+	.	.	.	1,1	+,1	II^{+-1}
	Linaria repens (L.) Mill.	.	.	.	+	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I^{r-1}
F	*Lathyrus pratensis* L.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	i	1	.	.	1,1	1,1	.	.	+	.	+	.	1,1	1,3	1,1	2,2	III^{r-2}
	Dactylis glomerata L.	+	.	2,2	1,1	1,1	.	.	.	+,3	+,3	+	r	.	.	2,2	.	2,2	1,1	.	2,2	.	1,1	1,2	1,1	+	+	IV^{r-2}
	Daucus carota L.	+	.	.	+	1,1	.	.	.	r	.	.	.	.	.	1,1	.	1,1	r	.	1,1	.	+	r	.	.	.	II^{r-1}
	Poa pratensis L.	1	.	.	1,1	2,2	.	1	+	.	.	.	+	.	.	1,1	.	2,2	3,3	.	2,2	1,1	1,1	.	.	.	+,1	III^{+-2}
	Rumex acetosa L.	1	1,1	1,1	1,1	1,1	.	.	+	+	+	.	+	+	r	1,1	+	1,1	1,1	+	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	V^{r-2}
	Achillea millefolium L.	.	2,2	.	1,1	1,1	+	.	.	1,1	+	1,1	+	.	.	.	1,1	.	.	+	1,1	.	1,1	.	.	1,1	.	III^{+-2}
	Medicago sativa L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	.	I^{r-1}
	Bromus hordeaceus L.	1	.	.	1,1	1,1	.	1	1	.	.	.	+	2,2	2,2	.	.	1,1	.	.	.	.	2,2	+,2	2,3	2,2	.	III^{+-2}
P++	*Bellis perennis* L.	.	.	.	.	.	+	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I^{r-1}
	Convolvulus arvensis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+,2	+	.	.	.	.	1,1	.	.	.	r	.	.	I^{r-1}
	Galium mollugo L.	.	.	1,1	2,2	1,1	1	+	1	1,1	+	+	.	1,2	+,2	1,1	.	1,1	3,3	2,2	1,1	.	2,2	.	.	.	+	IV^{+-3}
	Silene vulgaris (Moench) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	1,1	.	.	.	.	+,2	1,1	.	I^{r-1}
	Plantago lanceolata L.	.	2,2	1,1	2,2	3,3	1	+	1	+	+	.	+	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1	+	1,1	2,2	2,2	V^{+-3}
	Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	1,1	+	2,2	.	1,1	.	.	1,1	.	II^{+-2}
	Agrostis capillaris L.	.	.	2,2	1,1	.	1	1	.	+	2,2	1,1	+	+	.	1,1	1,1	1,1	.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	2,2	3,3	IV^{+-3}
	Trifolium dubium Sibth.	.	.	1,1	.	+	1	+	.	+	.	.	+	1,2	1,1	.	.	.	.	.	+	+	.	+,2	+,2	1,1	+,1	III^{+-1}
Espèces annuelles																												
	Ornithopus perpusillus L.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Jacobaea vulgaris Gaertn.	.	1,1	+	+	+	.	+	.	r	+	+	1	.	.	+	+	1,1	.	.	+	.	+	r,2	.	.	.	III^{r-1}
	Geranium dissectum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	+,1	I^{+-1}
	Aira caryophyllea L.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Medicago lupulina L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Trifolium campestre Schreb.	.	.	.	+	1,1	.	.	+	+	.	.	.	r	.	.	.	1,1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	II^{r-1}
	Cerastium glomeratum Thuill.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	.	2,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	+,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-2}
	Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Myosotis ramosissima Rochel	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	I^{r-+}
	Ervilia hirsuta (L.) Opiz	.	1,1	.	+	+	.	+	+	+	.	.	+	+	.	.	1,1	.	.	.	.	.	1,1	.	1,2	.	+	III^{+-1}
	Valerianella locusta (L.) Laterr.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+}
	Cerastium semidecandrum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Veronica arvensis L.	.	1,1	+	+	.	.	+	.	.	.	.	+	1,1	1,1	1,1	.	+	.	.	.	.	.	r	+	1,1	+	III^{r-1}
	Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-+}
	Scleranthus annuus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Geranium molle L.	.	.	.	1,1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I^{+-1}
	Sherardia arvensis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1,2	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I^{+-1}
	Ervum tetraspermum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I^{r-1}
P++	*Anisantha sterilis* (L.) Nevski	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Vicia lathyroides L.	.	+,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Myosotis arvensis Hill	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Senecio vulgaris L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
Espèces compagnes																												
M	*Sanguisorba officinalis* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	$+^{r}$
C	*Potentilla reptans* L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
M F	*Heracleum sibiricum* L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	1
M	*Geranium pyrenaicum* Burm.f.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I^{i-+}
	Carex spicata Huds.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
M	*Bistorta officinalis* Delarbre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	$+^{+}$
	Chaerophyllum aureum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	1,1	.	I^{1}
	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{+}
	Rumex crispus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{i}
	Poa trivialis L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	1,1	.	I^{+-1}
	Alopecurus pratensis L.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I^{1}
	Andryala integrifolia L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Lathyrus nissolia L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Ornithogalum gr. *umbellatum*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Cornus sanguinea L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	1
	Potentilla sterilis (L.) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Clinopodium nepeta (L.) Kuntze	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I^{1}
	Hordeum murinum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{i}$
	Medicago arabica (L.) Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	1
	Prunus mahaleb L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Crepis setosa Haller f.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I^{r-i}
	Taraxacum sect. *Erythrosperma* (Lindb.f.) Dahlst.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Reseda phyteuma L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{r}$
	Rumex sanguineus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Viola alba Besser	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Vulpia C.C.Gmel.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Medicago L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
	Populus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	1
	Valerianella Mill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Echium vulgare L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$
	Silene latifolia Poir.	.	+,1	.	+	1,1	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	I^{r-1}
	Picris hieracioides L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	$+^{i}$
	Cytisus scoparius (L.) Link	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{i}$
	Crataegus monogyna Jacq.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$+^{+}$

Tableau extrait de : Le Hénaff P.- M., Galliot J.-N, Le Gloanec V., Ragache Q. 2021 - Végétations agropastorales du Massif central - Catalogue phytosociologique. Conservatoire botanique national du Massif central, 528 p.