

Colchico autumnalis-Festucetum pratensis

(J. Duvern.) B. Didier & J.-M. Royer 1989

Numéro relevé		235690	655750
Altitude (m)		170	207
Pente relevé (°)		nd	nd
Exposition			
Surface (m²)		nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd
Nombre de taxons		42	48
Combinaison caractéristique			
C	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	.	1
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	+	2
	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	.	1
	F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1	2
	<i>Bromus racemosus</i> L.	.	2
	F <i>Phleum pratense</i> L.	.	1
	P <i>Lolium perenne</i> L.	+	1
	<i>Briza media</i> L.	1	2
	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	.	+
	<i>Dichoropetalum carvifolia</i> (Vill.) Pimenov & Kljuykov	.	2
F	<i>Glechoma hederacea</i> L.	.	1
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	+	1
	<i>Ajuga reptans</i> L.	1	.
	Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles		
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+	2
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	.	1
	C <i>Allium vineale</i> L.	+	.
	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	2	.
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	+	+
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	1	.
P	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	4	.
	<i>Ononis spinosa</i> L.	+	.
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	2	.
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	+	.
	Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles		
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	1	.
	<i>Galium verum</i> L.	+	2
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	+
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	+	.
	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	+	1
P	Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles		
	F <i>Crepis biennis</i> L.	.	1
	P <i>Scorzoneroideis autumnalis</i> (L.) Moench	.	2
	<i>Carex spicata</i> Huds.	+	.
	<i>Carum carvi</i> L.	.	+
	Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles		
	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	+	.
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	+	.
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	.	2
	<i>Centaurea jacea</i> L.	1	.
C	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	.	1
	<i>Festuca rubra</i> L.	1	.
	Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles		
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	.	1
	<i>Carex hirta</i> L.	+	.
	P <i>Potentilla reptans</i> L.	+	1
	<i>Rumex crispus</i> L.	.	+
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	.	1
	Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres		
	P++ <i>Carex tomentosa</i> L.	+	.
F	<i>Succisa pratensis</i> Moench	1	.
	Espèces à large amplitude		
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	2	.
	<i>Holcus lanatus</i> L.	.	2
	<i>Daucus carota</i> L.	1	.
	<i>Poa pratensis</i> L.	1	2
	<i>Trifolium pratense</i> L.	1	2
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	2
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	1
	<i>Trifolium repens</i> L.	1	2
P	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1	2
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	2
	F <i>Tragopogon pratensis</i> L.	+	1
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+	.
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	2
	<i>Rumex acetosa</i> L.	+	1
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	+	+
	Bryophytes		
	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	.	+
	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob.	2	.
F	Autres taxons		
	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	.	+
	<i>Symphytum officinale</i> L.	.	+
	<i>Allium oleraceum</i> L.	+	.
	<i>Thalictrum flavum</i> L.	.	+
	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	.	1
	<i>Festuca</i> L.	.	3
	<i>Medicago lupulina</i> L.	2	.
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	.	+
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	+	.
P	<i>Equisetum palustre</i> L.	.	+
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	.	+