

Poo angustifoliae-Avenuletum pubescentis

Loiseau & Feizines ex Feizines 2012

Numéro relevé	650737	650740	650741	650743	SYNTHESE
Altitude (m)	nd	nd	nd	nd	nd
Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition					
Surface (m²)	20	20	25	100	41
Recouvrement total (%)	95	95	100	100	98
Nombre de taxons	29	28	33	38	32
Combinaison caractéristique					
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	3,2	2,2	3,3	2,2	V ²⁻³
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort.	2,2	1,2	1,2	2,2	V ¹⁻²
F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1,2	2,2	1,2	4,3	V ¹⁻⁴
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	+	+	1	.	IV ⁺¹
<i>Vicia angustifolia</i> L.	.	1	+	+	IV ⁺¹
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	+	2	1	+	V ⁺²
<i>Campanula rapunculus</i> L.	.	.	+	1	III ⁺¹
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	.	1,2	2,2	+	IV ⁺²
<i>Eryngium campestre</i> L.	+	2	1	1	V ⁺²
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	.	+	.	+	III ⁺
<i>Poterium sanguisorba</i> L.	+	.	+	+	IV ⁺
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	+	+	+	.	IV ⁺
<i>Silene latifolia</i> Poir.	+	.	.	1	III ⁺¹
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres					
<i>Sedum rupestre</i> L.	.	.	2,2	+	III ⁺²
<i>Artemisia campestris</i> L.	.	.	1,2	.	II ¹
<i>Stachys recta</i> L.	.	.	1	.	II ¹
C <i>Festuca longifolia</i> Thuill.	1,2	1,2	1,2	.	IV ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres					
<i>Rumex acetosella</i> L.	1	.	+	.	III ⁺¹
<i>Potentilla verna</i> L.	.	.	1,2	.	II ¹
CI <i>Galium album</i> Mill.	+	.	.	.	II ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles					
<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	+	+	1	IV ⁺¹
<i>Carex caryophyllaea</i> Latour.	.	1	.	.	II ¹
<i>Pilosella officinarum</i> Vahl., 1754	.	.	1,2	.	II ¹
<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	+	+	+	IV ⁺
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	+	.	+	+	IV ⁺
<i>Poa bulbosa</i> L.	.	.	+	.	II ⁺
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	1,2	II ¹
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles					
<i>Galium verum</i> L.	.	2	.	.	II ²
C <i>Malva moschata</i> L.	.	2	.	.	II ²
<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	.	.	.	II ⁺
<i>Saxifraga granulata</i> L.	.	1	2	+	IV ⁺²
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles					
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	1,2	II ¹
<i>Festuca rubra</i> L.	1	.	.	.	II ¹
<i>Stellaria graminea</i> L.	.	.	.	1	II ¹
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Centaurea jacea</i> L.	.	.	.	+	II ⁺
Espèces à large amplitude					
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	1,2	.	.	II ¹
<i>Achillea millefolium</i> L.	2	.	+	1	IV ⁺²
F <i>Tragopogon pratensis</i> L.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	+	+	.	III ⁺
<i>Stellaria holostea</i> L.	.	.	.	1,2	II ¹
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	.	.	.	1	II ¹
F <i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	.	1	II ¹
<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	+	.	II ⁺
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	2,2	1,2	.	III ¹⁻²
<i>Daucus carota</i> L.	.	.	1	.	II ¹
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	1	II ¹
<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	.	1	II ¹
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	.	.	+	II ⁺
Autres taxons					
<i>Carex leersii</i> F.W.Schultz	.	.	.	1,2	II ¹
<i>Carex hirta</i> L.	+	1	.	.	III ⁺¹
F <i>Heracleum sphondylium</i> L.	.	.	.	1	II ¹
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	.	.	.	1	II ¹
<i>Hieracium</i> L.	.	.	.	1	II ¹
<i>Quercus robur</i> L.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Prunus spinosa</i> L.	+	+	.	.	III ⁺
Espèces annuelles					
<i>Ervilla hirsuta</i> (L.) Opiz	.	1	.	1	III ¹
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	+	.	.	.	II ⁺
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	.	1	.	.	II ¹
<i>Aira caryophyllaea</i> L.	+	.	.	.	II ⁺
<i>Geranium columbinum</i> L.	+	.	.	.	II ⁺
<i>Geranium molle</i> L.	+	1	.	.	III ⁺¹
<i>Veronica arvensis</i> L.	+	1	.	.	III ⁺¹
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	.	.	.	II ⁺
Bryophytes					
<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.	1,2	1,2	2,2	1,2	V ¹⁻²
<i>Plagiommium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop.	1	1	+	.	IV ⁺¹
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	2,2	.	1,2	.	III ¹⁻²
<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.	+	.	.	.	II ⁺
<i>Brachythecium mildeanum</i> (Schimp.) Schimp.	.	.	1,2	.	II ¹
<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch.	.	.	1,2	.	II ¹
Ascomycètes					
<i>Peltigera praetextata</i> (Flörke ex Sommerf.) Zopf	+	.	.	.	II ⁺