

Festuco trichophyllae-Gaudinietum fragilis

Choisnet ass. nov

Numéro relevé		513339	513342	513344	513347	513348	513350	513351	513357	544040	544041	547092	SYNTHESE
Altitude (m)		370	370	380	375	365	365	365	365	180	180	200	320
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1	nd	1
Exposition													
Surface (m²)		20	25	10	20	20	20	15	15	20	5	25	18
Recouvrement total (%)		98	100	100	100	95	100	100	95	85	95	98	97
Nombre de taxons		27	22	24	25	30	25	26	31	20	20	32	26
Combinaison caractéristique													
Ci	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	3,3	.	.	2,2	3,3	.	1,1	1,1	4,4	3,3	2,2	IV ⁻¹⁻⁴
	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	.	2,3	3,3	.	.	+	1,1	2,2	.	.	2,2	III ⁺³
	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	+	1,1	1,1	1,1	.	+	1,1	1,1	.	+	+	IV ⁺¹
	<i>Silau silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	r,2	2,2	2,2	.	.	2,2	1,1	2,2	+	2,2	+	IV ⁻²
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	2,2	1,1	.	+	2,2	.	2,2	+	2,2	1,1	+	V ⁺²
C	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	+	+	.	r	i	r	.	.	r	III ^{r+}
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	+	+	.	.	1,1	.	.	.	1,1	+	+	III ⁺¹
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1,2	2,2	.	2,2	+	.	.	2,2	.	.	.	III ⁺²
	<i>Trifolium pratense</i> L.	1,1	.	1,1	+	3,3	1,1	2,2	1,1	+	+	2,2	V ⁺³
	<i>Bromus racemosus</i> L.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	1,1	3,3	3,3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	V ¹⁻³
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	+	2,2	2,2	1,1	+2	2,2	V ⁺²
	<i>Inula salicina</i> L.	+2	3,3	2,3	2,3	.	4,5	.	.	.	.	.	III ⁺⁴
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres													
Ci	<i>Galium album</i> Mill.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	+2	+	.	+	III ⁺¹
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	+	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	.	.	.	r,2	1,1	.	.	.	.	.	.	I ^{r-1}
	<i>Thymus gr. pulegioides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	I ⁱ
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles													
	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	2,2	3,3	.	+2	.	.	.	.	II ⁺³
	<i>Poa bulbosa</i> L.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	1,1	.	.	.	1,1	.	.	2,2	.	.	1,1	II ¹⁻²
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	.	.	.	.	2,2	.	.	+	.	.	2,2	II ⁺²
	<i>Briza media</i> L.	2,2	.	1,1	1,1	.	.	+	+	1,1	.	+	III ⁺²
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles													
	<i>Galium verum</i> L.	3,3	2,2	2,2	3,3	2,2	2,2	2,2	r	2,2	1,1	3,3	V ^{r-3}
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	.	.	.	.	2,3	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Ononis spinosa</i> L.	2,2	.	r	1,1	.	+	1,1	2,2	.	.	+	III ^{r-2}
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles													
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	.	2,2	2,2	+	.	2,2	.	.	.	.	.	II ⁺²
	<i>Centaurea jacea</i> L.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹
	<i>Leucanthemum gr. vulgare</i>	+	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	II ⁺
	<i>Centaurea subgen. Jacea</i> (Mill.) Hayek	+	2,2	1,1	.	+	+	+	+	.	.	.	III ⁺²
C	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	+2	2,2	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	II ⁺²
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres													
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	I ⁺
	<i>Carex panicea</i> L.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
P++	<i>Carex tomentosa</i> L.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺¹
Espèces à large amplitude													
	<i>Galium mollugo</i> L.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	+	.	II ⁺
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	+	.	1,1	.	.	+	+	.	+	+	1,1	III ⁺¹

<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	I ⁺
<i>Plantago lanceolata</i> L.	1,1	.	+	2,2	2,2	.	1,1	1,1	.	.	r	III ^{r-2}
<i>Ranunculus acris</i> L.	.	+	2	.	.	3,3	.	.	.	1,1	.	II ⁺³
<i>Daucus carota</i> L.	1,1	+	.	2,2	1,1	+	+	.	+	+	+	IV ⁺²
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1,1	.	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	1,1	.	.	+	IV ⁺²
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Dactylis glomerata</i> L.	2,2	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2	.	2,2	+	.	.	IV ⁺²
<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	+	2	.	+	+	+	.	.	1,1	III ⁺¹
<i>Poa pratensis</i> L.	.	+	2	.	.	+	.	+	.	+	.	III ⁺
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I ^r
<i>Lotus glaber</i> Mill.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	r	.	.	I ^{r-1}
Autres taxons												
<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1,1	I ⁺¹
<i>Ajuga reptans</i> L.	.	.	+	.	.	+	1,1	.	.	i	.	II ⁱ⁻¹
<i>Carex hirta</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	.	2,2	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	.	.	+	.	+	2	.	.	.	.	2,2	II ⁺²
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	.	.	.	.	+	.	.	.	1,2	+	1,1	II ⁺¹
<i>Aristolochia rotunda</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I ¹
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
<i>Asparagus officinalis</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	.	.	.	.	r	.	4,4	3,3	.	.	.	II ^{r-4}
<i>Leucanthemum pallens</i> (J.Gay ex Perreyem.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Dactylorhiza occitanica</i> Geniez, Melki, Pain & R.Soca	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	+	I ⁱ⁺
<i>Potentilla</i> L.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	+	.	I ⁱ⁺
<i>Vicia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Allium</i> L.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
<i>Lotus</i> L.	2,2	.	+	.	.	1,1	.	+	.	.	.	II ⁺²
<i>Ophrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	I ⁱ
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	I ⁱ
Espèces annuelles												
<i>Medicago lupulina</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	+	+	.	+	II ⁺¹
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺