

Luzulo campestris-Brometum hordeacei

B. Foucault (1981) 2008

Numéro relevé		303520	312832	356029	650681	365846	366872	373166	373408	382131	382159	575123	584022	610251	627557	SYNTHESE
Altitude (m)		535	255	260	nd	740	475	320	530	450	500	565	286	237	245	415
Pente relevé (°)		15	nd	nd	nd	2	2	10	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7
Exposition		E				N	ESE	O	NO			E				
Surface (m²)		100	100	400	100	100	75	100	100	nd	nd	30	25	40	40	101
Recouvrement total (%)		95	100	100	100	100	100	100	100	nd	nd	100	100	100	100	100
Nombre de taxons		33	34	39	42	29	30	38	27	29	26	42	31	29	34	33
Combinaison caractéristique																
<i>Centaurea jacea</i> L.		.	.	2	.	.	.	1,1	.	1	1	1	.	.	.	II ¹⁻²
<i>Centaurea subgen. Jacea</i> (Mill.) Hayek		1,2	+	.	.	2,2	2,2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	II ¹⁻²
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.		+1	+	+	+	2,2	2,2	1,1	2,2	.	.	r	1	.	1	IV ¹⁻²
F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl		+3	+	1	1	2,2	3,3	2,2	3,3	2	1	.	3	2	1	V ¹⁻³
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.		1,2	.	1	1	.	.	2,2	+1	+	.	1	.	+	1	IV ¹⁻²
C <i>Malva moschata</i> L.		.	.	+	.	.	.	r	.	.	.	.	1	1	.	II ¹⁻¹
<i>Bromus hordeaceus</i> L.		.	+	.	2	2,2	.	1,1	.	.	.	i	1	1	+	III ¹⁻²
F <i>Heracleum sphondylium</i> L.		+1	.	+	.	.	2,2	.	.	.	.	r	.	3	1	II ¹⁻³
<i>Rhinanthus minor</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.		+1,1 cf	1 cf	1 cf	+ cf	1,1 cf	2,2 cf	1,1 cf	2,2 cf	.	1 cf	1 cf	+	1	3	V ¹⁻³
<i>Lotus corniculatus</i> L.		.	+	1	1	.	1,1	1,1	.	1	1	+	1	1	1	IV ¹⁻¹
<i>Leontodon hispidus</i> L.		1,3	.	.	.	.	.	.	1,1	+	1	.	.	.	.	II ¹⁻¹
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		2,2	.	.	+	2,2	2,2	.	2,2	.	.	+	+	.	1	III ¹⁻²
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.		.	.	.	.	.	.	1,2	+1	.	.	.	1	2	1	II ¹⁻²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres																
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.		.	r	1	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	II ¹⁻¹
<i>Poterium sanguisorba</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Ci <i>Galium album</i> Mill.		.	.	.	.	.	.	.	1,1	1	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Thymus gr. pulegioides</i>		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Rumex acetosella</i> L.		.	.	.	.	.	r	+1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹⁻¹
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.		.	1	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹⁻¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles																
<i>Hypericum perforatum</i> L.		.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Eryngium campestre</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ¹
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Briza media</i> L.		+3	.	+	r	.	1,1	.	.	.	.	+	.	.	.	II ¹⁻¹
<i>Galium verum</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ¹⁻¹
<i>Primula veris</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ¹⁻¹
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.		.	.	+	.	.	.	+1	1,1	.	.	.	1	+	.	II ¹⁻¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles																
<i>Vicia gr. sativa</i>		.	+	.	.	.	+1	+1	.	1	.	.	.	.	.	II ¹⁻¹
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret		.	.	.	.	1,1	r	.	.	.	.	i	.	.	.	II ¹⁻¹
F <i>Vicia cracca</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
Ci F <i>Crepis vesicaria</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles																
<i>Hieracium umbellatum</i> L.		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Carex flacca</i> Schreb.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ¹
<i>Linum usitatissimum</i> L.		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	II ¹⁻²
<i>Ononis spinosa</i> L.		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles																
C F <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	i	.	.	.	I ¹⁻¹
M <i>Centaurea nigra</i> L.		.	.	.	1	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Prunella vulgaris</i> L.		+1	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II ¹⁻¹
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ¹
<i>Betonica officinalis</i> L.		.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles																
<i>Festuca rubra</i> L.		2,2 cf	.	2 cf	3	2,2	1,2	2,2	2,2	1	1	+	2	.	1	III ¹⁻³
Ci <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	2	II ¹⁻²
<i>Veronica chamaedrys</i> L.		1,1	.	.	+	1,1	+1	+1	+1	+	.	.	.	.	+	III ¹⁻¹
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.		.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Stellaria graminea</i> L.		1,1	+	.	.	1,1	1,1	1,1	+1	.	.	r	+	.	1	IV ¹⁻¹
Espèces des milieux sains à humides fertiles																
<i>Rumex crispus</i> L.		.	r	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	II ¹⁻¹
<i>Rumex obtusifolius</i> L.		.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Alopecurus pratensis</i> L.		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Poa trivialis</i> L.		1,3	.	.	2	1,1	.	2,2	.	.	.	.	.	1	+	III ¹⁻²
<i>Ranunculus repens</i> L.		.	.	.	+	r	.	r	.	.	.	.	.	.	.	II ¹⁻¹
Espèces à large amplitude																
<i>Daucus carota</i> L.		.	2	+	.	.	.	.	.	.	.	r	2	.	1	II ¹⁻²
F <i>Tragopogon pratensis</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	1	+	r	.	.	.	II ¹⁻¹
<i>Dactylis glomerata</i> L.		2,2	1	+	1	1,1	.	2,2	2,2	1,2	1	i	2	3	1	V ¹⁻³
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.		.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	1	1	1	II ¹⁻¹

Numéro relevé		303520	312832	356029	650681	363846	366872	373166	373408	382131	382159	575123	584022	610251	627557	SYNTHESE
Altitude (m)		535	255	260	nd	740	475	320	530	450	500	565	286	237	245	415
Pente relevé (°)		15	nd	nd	nd	2	2	10	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	7
Exposition		E				N	ESE	O	NO			E				
Surface (m²)		100	100	400	100	100	75	100	100	nd	nd	30	25	40	40	101
Recouvrement total (%)		95	100	100	100	100	100	100	100	nd	nd	100	100	100	100	100
Nombre de taxons		33	34	39	42	29	30	38	27	29	26	42	31	29	34	33
P	<i>Lolium perenne</i> L.	2,2	.	.	1	1,1	.	1,1	.	+	1	r	.	.	.	III ^{r-2}
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	1,3	.	.	1	1,1	.	+1	+1	1	.	+	1	.	1	IV ⁺¹
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	1,3	i	.	+	.	1,1	1,1	1,1	.	1	r	1	1	2	IV ^{r-2}
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	.	.	+	1,1	.	.	+1	+	1	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	3	.	.	+1	+1	1	1	+	.	.	.	III ⁺³
P++	<i>Bellis perennis</i> L.	1,3	.	.	+	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	II ^{r-1}
P	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	2,2	.	.	+	.	.	1,1	+1	+	1	1	1	.	.	III ⁺²
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	1,2	+	.	+	+1	1,1	+1	+1	.	.	.	.	+	.	III ⁺¹
	<i>Holcus lanatus</i> L.	1,3	1	2	2	2,2	2,2	3,3	.	1	1	+	3	2	1	V ⁺³
	<i>Trifolium pratense</i> L.	2,3	.	.	1	2,2	2,2	2,2	1,1	1	2	+	1	1	1	V ⁺²
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	1	II ⁺¹
	<i>Ranunculus acris</i> L.	1,2	+	.	1	1,1	+1	1,1	.	+	1	.	.	.	1	III ⁺¹
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	1,2	2	1	2	2,2	.	.	.	.	2	1	2	1	2	IV ¹⁻²
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	2,2	1	2	1	1,1	2,2	1,1	1,1	+	1	+	1	1	1	V ⁺²
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	+	.	+	.	.	.	.	1	1,2	r	.	.	.	II ^{r-1}
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1,1	1	1	1	2,2	2,2	2,2	.	.	.	r	2	1	2	V ^{r-2}
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	+	2	2,2	2,2	1,1	1,1	.	.	+	.	.	.	III ⁺²
	<i>Achillea millefolium</i> L.	2,2	3	+	+	1,1	1,1	1,1	.	+	1	.	2	.	2	IV ⁺³
	<i>Rumex acetosa</i> L.	2,2	+	+	+	1,1	1,1	+1	1,1	.	1	r	2	+	1	V ^{r-2}
Autres taxons																
	<i>Cardamine pratensis</i> L.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Myosotis dubia</i> Arrond.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
F	<i>Crepis biennis</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Vicia sepium</i> L.	r	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ^{r+}
	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ⁺¹
P	<i>Scorzoneroideis autumnalis</i> (L.) Moench	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	I ⁺¹
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ajuga reptans</i> L.	+2	r	.	.	+1	1,1	.	.	.	+	.	.	.	.	II ^{r-1}
	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West	+3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Scorzonera humilis</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
F+	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Carex divulsa</i> Stokes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Hylotelephium</i> gr. <i>telephium</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Viola arvensis</i> Murray	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Vicia sativa</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Leontodon</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ¹
	<i>Quercus</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Allium</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
F	<i>Phleum pratense</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ⁺¹
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces annuelles																
	<i>Geranium dissectum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	I ⁺¹
	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	1	II ⁺¹
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	.	.	.	.	.	.	+1	+1	.	.	.	.	.	1	II ⁺¹
	<i>Veronica arvensis</i> L.	.	.	.	.	+1	.	+1	+1	.	.	r	.	.	.	II ^{r+}
	<i>Ervilla hirsuta</i> (L.) Opiz	.	.	.	.	.	.	1,1	.	+	1	r	1	1	.	III ^{r-1}
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	i	.	.	.	I ¹⁻¹