

Medicagini lupulinae-Cynosuretum cristati

H. Passarge 1969

Numéro relevé		558487	663056	558518	558540	650631	SYNTHESE
Altitude (m)		275	260	353	293	nd	295
Pente relevé (°)		10	nd	10	10	nd	10
Exposition		NO		O	NE		
Surface (m²)		50	nd	50	50	15	41
Recouvrement total (%)		95	nd	90	100	nd	95
Nombre de taxons		44	34	36	27	38	36
Combinaison caractéristique							
C	<i>Medicago lupulina</i> L.	.	3,3	.	.	1,1	II ¹⁻³
	<i>Plantago media</i> L.	.	3,3	.	.	2,2	II ²⁻³
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	.	+	.	i	.	II ¹⁺
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	+	2,3	5	3	.	IV ⁺⁵
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	2,2	1	+	2,2	V ⁺²
	<i>Festuca rubra</i> L.	3	1,3	.	.	1,1	III ¹⁻³
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1	.	.	.	2,2	II ¹⁻²
	<i>Centaurea jacea</i> L.	1	.	1	2	.	III ¹⁻²
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	1	.	+	+	2,2	IV ⁺²
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1	3,3	.	.	2,2	III ¹⁻³
P++	<i>Carex tomentosa</i> L.	.	.	.	.	1,1	I ¹
	<i>Cardamine pratensis</i> L.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	.	r	2,2	II ^{r-2}
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres							
	<i>Rumex acetosella</i> L.	+	.	+	.	.	II ⁺
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles							
	<i>Eryngium campestre</i> L.	.	.	2	.	.	I ²
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	.	2,2	.	i	2,2	III ¹⁻²
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	.	.	1	r	.	II ^{r-1}
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	+	.	.	.	2,2	II ⁺²
	<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	1,1	I ¹
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill., 1754	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	3	2,2	.	.	.	II ²⁻³
Ci	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	r	.	.	.	.	I ^r
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles							
Ci	<i>Salvia pratensis</i> L.	1	.	+	i	.	III ¹⁻¹
	<i>Primula veris</i> L.	.	+	.	.	2,2	I ⁺²
C	<i>Malva moschata</i> L.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Galium verum</i> L.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	.	.	r	.	.	I ^r
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	+	3,3	+	.	.	III ⁺³
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles							
	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	1	.	.	.	3,3	II ¹⁻³
	<i>Briza media</i> L.	+	.	.	.	2,2	II ⁺²
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	.	.	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles							
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	.	.	2,2	I ²
C	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	.	.	.	i	.	I ⁱ
	<i>Linum catharticum</i> L.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Ononis spinosa</i> L.	.	.	1	r	1,1	III ^{r-1}
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles							
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	+	3,3 cf	.	.	+	III ⁺³
C F	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	+	2,2	r	.	.	III ^{r-2}
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	+	.	.	1,1	II ⁺¹
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	.	.	.	.	1,1	I ¹
	<i>Campanula glomerata</i> L.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles							
F	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	.	.	.	r	.	I ^r
P	<i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Vicia sepium</i> L.	r	.	.	.	.	I ^r
Espèces à large amplitude							
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	r	.	+	1	.	III ^{r-1}

Numéro relevé		558487	663056	558518	558540	650631	SYNTHESE
Altitude (m)		275	260	353	293	nd	295
Pente relevé (°)		10	nd	10	10	nd	10
Exposition		NO		O	NE		
Surface (m²)		50	nd	50	50	15	41
Recouvrement total (%)		95	nd	90	100	nd	95
Nombre de taxons		44	34	36	27	38	36
<i>Trifolium pratense</i> L.		1	3,3	.	.	+	III ⁺³
<i>Trifolium repens</i> L.		+	2,2	1	+	2,2	V ⁺²
<i>Plantago lanceolata</i> L.		+	+	2	2	.	IV ⁺²
<i>Rumex acetosa</i> L.		.	+	r	+	.	III ^{r+}
<i>Ranunculus acris</i> L.		.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.		+	+	.	.	+	III ⁺
<i>Galium mollugo</i> L.		1	.	1	+	.	III ⁺¹
P++ <i>Bellis perennis</i> L.		1	1,1	.	.	1,1	III ¹
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		1	.	1	.	1,1	III ¹
F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl		r	.	.	.	.	I ^r
<i>Bromus hordeaceus</i> L.		.	.	+	.	.	I ⁺
P <i>Cynosurus cristatus</i> L.		+	1,1	.	.	1,1	III ⁺¹
<i>Dactylis glomerata</i> L.		+	3,3	+	.	.	III ⁺³
<i>Holcus lanatus</i> L.		+	1,1	.	.	1,1	III ⁺¹
P <i>Lolium perenne</i> L.		+	3,3	+	1	+	V ⁺³
<i>Poa pratensis</i> L.		1	1,1	1	.	.	III ¹
<i>Achillea millefolium</i> L.		+	.	1	1	+	IV ⁺¹
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.		.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>		.	+	.	.	1,1	II ⁺¹
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		1	+	2	.	1,1	IV ⁺²
<i>Convolvulus arvensis</i> L.		.	.	+	+	.	II ⁺
Autres taxons							
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz		.	.	.	.	2,2	I ²
<i>Hippocrepis comosa</i> L.		1	.	.	.	.	I ¹
<i>Ranunculus repens</i> L.		+	.	.	.	.	I ⁺
C <i>Potentilla reptans</i> L.		.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Stellaria graminea</i> L.		+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Veronica chamaedrys</i> L.		.	.	.	+	.	I ⁺
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.		+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.		+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.		.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Filago germanica</i> L.		.	.	r	.	.	I ^r
<i>Chenopodium album</i> L.		.	.	.	1	.	I ¹
<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>		.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Allium</i> L.		.	.	i	.	.	I ⁱ
<i>Taraxacum</i> F.H.Wigg.		.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Cerastium</i> L.		.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Festuca</i> L.		+	.	.	2	.	II ⁺²
<i>Centaurea</i> L.		.	2,2	.	.	.	I ²
<i>Rumex</i> L.		.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Avenula</i> (Dumort.) Dumort.		.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces annuelles							
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		1	.	.	.	.	I ¹
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.		r	+	i	.	.	III ^{r+}
<i>Geranium columbinum</i> L.		.	.	.	+	.	I ⁺
Bryophytes							
<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.		.	+2	.	.	.	I ⁺
<i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske		.	+2	.	.	.	I ⁺