

Diantho hyssopifolii-Brachypodietum rupestris

G. Lemée & Carbiener 1956 nom. invers., corr., mut.

		14891	14894	14889	14903	14898	14908	14901	14906	14910	14913	14912	SYNTHESE
Numéro relevé													
Altitude (m)		1 135	1 100	1 000	1 150	1 140	1 170	1 120	1 210	1 130	1 190	1 195	1 140
Pente relevé (°)		13	25	nd	20	15	20	22	10	10	15	nd	17
Exposition		S	SSO		S	ESE	S	E	SSO	S	NE		
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nombre de taxons		50	51	31	36	34	30	49	37	43	51	40	41
Combinaison caractéristique													
R-	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	+	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	V ⁻⁴
	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	.	+	+	+	2	1	+	1	+	+	+	V ⁻²
	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco	+	+	.	+	+	+	+	+	+	2	+	V ⁻²
M	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	.	.	+	+	.	+	.	+	+	+	.	III ⁺
M	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	+	+	.	.	.	+	+	+	.	1	2	III ⁺
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	+	.	.	.	.	+	+	+	+	.	.	III ⁺
M	<i>Viola lutea</i> Huds.	+	.	.	+	.	+	+	+	+	1	+	IV ⁺¹
	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	+	+	2	3	.	1	.	1	+	+	.	IV ⁺³
	<i>Galium pumilum</i> Murray	1	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+	V ⁻¹
Ci	<i>Galium album</i> Mill.	.	.	.	+	.	.	+	+	+	1	+	III ⁺¹
	<i>Betonica officinalis</i> L.	+	1	+	+	1	+	+	+	+	+	+	V ⁻¹
	<i>Campanula glomerata</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺
	<i>Asperula cynanchica</i> L.	+	+	+	.	+	.	+	.	.	.	.	III ⁺
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	+	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	II ⁺
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium pratense</i> L.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres													
	<i>Koeleria gr. pyramidata</i>	+	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres													
M	<i>Thesium alpinum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	+	+	+	+	+	+	.	1	+	.	+	IV ⁺¹
	<i>Silene nutans</i> L.	.	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	2	+	+	1	3	1	1	1	1	.	.	IV ⁺³
M	<i>Potentilla fagineicola</i> Lamotte	+	+	.	+	.	.	+	.	+	.	.	III ⁺
	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat	1	+	.	.	+	+	+	.	+	+	+	IV ⁺¹
	<i>Thymus gr. pulegioides</i>	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Genista sagittalis</i> L.	2	+	1	+	.	+	+	+	+	+	+	V ⁻²
	<i>Thymus gr. pulegioides</i>	+	+	1	1	.	+	+	+	+	.	.	IV ⁺¹
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	.	+	.	+	+	.	+	+	+	+	+	III ⁺
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	+	.	+	+	+	+	+	+	+	+	IV ⁺
	<i>Potentilla verna</i> L.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	+	1	+	+	+	.	+	.	+	.	.	III ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles													
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	+	.	.	+	+	+	.	.	+	+	2	III ⁺²
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	+	+	.	+	+	.	.	.	+	.	.	III ⁺
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	+	+	.	+	.	.	+	.	+	+	.	III ⁺
	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	+	III ⁺
R-	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺
M	<i>Cerastium arvense</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop.	+	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles													
	<i>Primula veris</i> L.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Galium verum</i> L.	+	.	+	+	+	.	+	+	+	+	3	IV ⁺³
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles													
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	.	.	+	+	+	+	1	.	2	1	+	IV ⁺²
	<i>Briza media</i> L.	1	+	.	+	+	+	+	+	+	+	+	V ⁻¹
	<i>Serratula tinctoria</i> L.	.	1	.	+	+	.	+	+	.	+	.	III ⁺¹
	<i>Galium saxatile</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles													
	<i>Polygala vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	1	1	+	+	III ⁺¹
	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller	+	1	.	+	.	.	+	+	.	.	.	III ⁺¹
	<i>Linum catharticum</i> L.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	1	II ⁺¹
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	I ⁺
M	<i>Hieracium sect. Prenantheidea</i> W.D.J.Koch	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	+	II ⁺¹

		14891	14894	14899	14903	14898	14908	14901	14906	14910	14913	14912	SYNTHESE
Numéro relevé		14891	14894	14899	14903	14898	14908	14901	14906	14910	14913	14912	SYNTHESE
Altitude (m)		1 135	1 100	1 000	1 150	1 140	1 170	1 120	1 210	1 130	1 190	1 195	1 140
Pente relevé (°)		13	25	nd	20	15	20	22	10	10	15	nd	17
Exposition		S	SSO	nd	S	ESE	S	E	SSO	S	NE	nd	
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nombre de taxons		50	51	31	36	34	30	49	37	43	51	40	41
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles													
M	<i>Centaurea nigra</i> L.	+	+	.	+	+	+	+	+	+	+	.	IV ⁺
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	+	+	.	.	+	.	+	.	.	+	.	III ⁺
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles													
	<i>Festuca rubra</i> L.	1	.	.	.	+	.	.	.	+	+	+	III ⁺¹
	<i>Stellaria graminea</i> L.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺¹
Espèces à large amplitude													
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	+	+	+	+	+	2	+	+	+	1	2	V ⁻²
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	.	.	+	+	+	+	+	1	+	.	IV ⁺¹
	<i>Achillea millefolium</i> L.	+	+	+	+	2	+	+	+	+	+	1	V ⁻²
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	+	1	II ⁺¹
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺
Espèces des landes													
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	+	3	4	.	+	2	1	3	3	+	+	V ⁻⁴
	<i>Genista pilosa</i> L.	+	1	2	.	+	1	+	1	+	+	.	IV ⁺²
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	.	.	.	.	.	2	4	2	2	.	.	II ²⁻⁴
Autres espèces													
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	II ⁺
	<i>Knautia basaltica</i> Chass. & Szabó	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	I ⁺²
	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
F	<i>Phleum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺
M	<i>Scorzoneroides pyrenaica</i> (Gouan) Holub	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
M	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	I ⁺
M	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Centaurea jacea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
M	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	I ⁺
	<i>Pinus sylvestris</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	II ⁺
	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium medium</i> L.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Corylus avellana</i> L.	+	+	+	.	+	+	+	.	+	.	.	III ⁺
	<i>Cotoneaster gr. integerrimus</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Campanula persicifolia</i> L.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	II ⁺
Genres													
	<i>Pilosella</i> Vaill.	+	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	III ⁺
	<i>Hieracium</i> <i>Hieracium</i> sect.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des mégaphorbiaies													
	<i>Astrantia major</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	3	+	II ⁺³
Espèces forestières													
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺