

Betonico officinalis-Galietum veri

Billy ex Thébaud, C. Roux, C.-E. Bernard & Delcoigne 2014 *nom. corr.*

		222611		222612	222614	222615	222617	222618	384559	384595	384601	384602	SYNTHESE
Numéro relevé													
Altitude (m)		1 170	1 200	1 220	1 250	1 210	1 170	1 180	1 290	1 220	1 220	1 213	
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition													
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nombre de taxons		31	30	25	30	28	26	30	43	30	25	30	
Combinaison caractéristique													
	<i>Betonica officinalis</i> L.	+	+	1	1	+	+	+	+	+	+	+	V ⁺¹
	<i>Campanula glomerata</i> L.	+	+	+	+	.	+	+	+	.	.	.	IV ⁺
	<i>Genista sagittalis</i> L.	1,2	1,2	2	1	1,2	1,2	1,2	1,2	+	1		V ⁺²
	<i>Thymus gr. pulegioides</i>	1	1,2	1	1	1	1	+	1	.	.		IV ⁺¹
	<i>Galium pumilum</i> Murray	.	+	+	.	+	.	+	1	+	+		IV ⁺¹
M	<i>Potentilla fagineicola</i> Lamotte	1	1	.	+	+	+	.	.	.	.		III ⁺¹
	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco	.	.	1	1	1	1	1	1	.	.		III ¹
	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	.	1	.	.	.	1	+	1,2	.	.		II ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres													
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	1,2	2	1,2	1,2	1	2	1,2	1	1	1		V ¹⁻²
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	.	.	+	+	.	1	+	.	+		III ⁺¹
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	1	1	1	+	+	1,2	.	+	.	.		IV ⁺¹
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	+	+	.	+	.	+	.	+	.	.		III ⁺
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	1	.	.	+	+	.	+	.	.	.		II ⁺¹
	<i>Koeleria gr. pyramidata</i>	1,2	.	.	.	.	+	.	.	.	.		I ⁺¹
M	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.		I ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles													
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	.	1	1	1	.	.	1	.	.		III ¹
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	+	+	+	.	.	+	1	.	.		III ⁺¹
	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	1	+	+	1	.	1,2	.	+	.	.		III ⁺¹
M	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.	.	.	+	.	+	1	.	+	.	+		III ⁺¹
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.		I ¹
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.		I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles													
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	1	.	1,2	1	.	.	.	.	.	.		II ¹
	<i>Galium verum</i> L.	1,2	1	1	1	2	1,2	1,2	1,2	.	.		IV ¹⁻²
	<i>Saxifraga granulata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.		I ⁺
R-	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	1	2	2	4	1,2	1	3	2	3	5		V ¹⁻⁵
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+		I ⁺
	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Méral	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.		I ⁺
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles													
	<i>Asperula cynanchica</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.		I ⁺
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	.	.	.	.	.	.	1	+	.	1		II ⁺¹
	<i>Nardus stricta</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.		I ¹
	<i>Briza media</i> L.	1	+	+	1	+	1	+	.	+	.		IV ⁺¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles													
F	<i>Vicia cracca</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.		I ⁺
M	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.		II ⁺
Espèces des milieux sains, très maigres à peu fertiles													
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.		I ⁺
	<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.		I ⁺
	<i>Carlina acanthifolia</i> All.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.		I ¹
	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.		I ⁺
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	.	.	1	+	.	1	.	+	.	.		II ⁺¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles													
M	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	.	.	.	.	.	.	+	1	+	.		II ⁺¹
M	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+		I ⁺
M	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.		I ⁺¹
	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.		I ⁺
	<i>Polygala vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.		I ⁺

Numéro relevé		222611	222612	222614	222615	222617	222618	384559	384595	384601	384602	SYNTHESE
Altitude (m)		1 170	1 200	1 220	1 250	1 210	1 170	1 180	1 290	1 220	1 220	1 213
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition												
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nombre de taxons		31	30	25	30	28	26	30	43	30	25	30
M	<i>Viola lutea</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	1	+	+	+	II ⁺¹
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	I ¹
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K.Mey.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	1	.	.	.	+	.	.	+	.	.	II ⁺¹
	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	.	+	.	+	.	.	+	+	.	.	II ⁺¹
	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles												
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Centaurea nigra</i> L.	.	+	1	+	+	.	1	.	1	1	IV ⁺¹
F	<i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	I ⁺
	<i>Leucanthemum</i> gr. <i>vulgare</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	II ⁺
	<i>Festuca</i> gr. <i>rubra</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	I ¹
Espèces des milieux frais moyennement fertiles												
	<i>Alchemilla</i> gr. <i>hybrida</i>	1	+	.	+	.	+	.	+	.	.	III ⁺¹
M	<i>Alchemilla</i> gr. <i>vulgaris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	I ¹
Espèces à large amplitude												
	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	1	1	1	1	.	+	1	+	+	V ⁺¹
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	1	1	1	+	1	.	.	+	+	IV ⁺¹
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1	.	+	+	.	1	.	1	.	.	III ⁺¹
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	.	1	1	1	1	.	.	.	.	III ¹
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	I ¹
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	II ⁺
Espèces des landes												
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	I ⁺¹
	<i>Genista pilosa</i> L.	.	1	1	.	1	.	.	1	.	.	II ¹
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces à large amplitude												
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
	<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
Autres taxons												
	<i>Silene nutans</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺