

Genisto sagittalis-Helianthemetum apennini

Billy ex Thébaud, C. Roux, C.-E. Bernard & Delcoigne 2014 *nom. corr.*

	Numéro relevé	222821	222822	222823	222824	222825	222826	343389	386052	386054	386055	386056	SYNTHESE
		930	800	580	680	780	900	535	520	520	485	606	
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	45	nd	nd	nd	nd	667
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	S	nd	nd	nd	nd	45
Exposition													
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	9	nd	nd	nd	nd	9
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	60	nd	nd	nd	nd	60
Nombre de taxons		21	26	26	22	26	22	15	21	20	19	23	22
Combinaison caractéristique													
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		2	+	+	1	+	1,2	2	+	1,2	1,2	1	V ⁺²
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.		1	1	1,2	1,2	1	1	.	.	1	1	1,2	IV ¹
<i>Genista sagittalis</i> L.		+	+	1,2	.	1,2	1,2	.	.	.	1	.	III ⁺¹
<i>Festuca lemanii</i> Bastard		2 cf	1 cf	.	1 cf	1 cf	2 cf	2 cf	1 cf	.	.	.	III ¹⁻²
<i>Stachys recta</i> L.		.	+	+	1	1	.	.	.	.	1	.	III ⁺¹
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.		.	1,2	.	1	1,2	1	.	1	.	1	+	III ⁺¹
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.		.	1,2	1	.	.	1,2	.	.	.	.	.	II ¹
<i>Centaurea stoebe</i> L.		.	.	.	.	.	.	1	+	+	.	1,2	II ⁺¹
Espèces des milieux secs très maigres													
<i>Thymus</i> gr. <i>praecox</i>		1,2	1	2	1	1	+	2	1,2	1,2	1,2	.	IV ⁺²
<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco		.	+	.	1	1,2	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
<i>Hippocrepis comosa</i> L.		.	.	2	.	.	.	.	+	1	1,2	.	II ⁺²
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.		1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres													
<i>Trifolium striatum</i> L.		+	.	.	1	1	.	.	+	1	1	.	III ⁺¹
R- <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
<i>Sedum acre</i> L.		+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Sedum album</i> L.		.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	II ¹
<i>Sedum rupestre</i> L.		1,2	.	1	.	.	.	i	.	.	.	1	II ⁱ⁻¹
<i>Artemisia campestris</i> L.		.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	I ¹⁻²
<i>Koeleria</i> gr. <i>pyramidata</i>		1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	II ¹
<i>Potentilla</i> gr. <i>argentea</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.		.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	1,2	II ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres													
<i>Potentilla verna</i> L.		1,2	1	1	1,2	.	1	1	1	1,2	1	1	V ¹
<i>Poterium sanguisorba</i> L.		.	+	1	1	1	1	1	+	1	1	.	IV ⁺¹
Ci <i>Galium album</i> Mill.		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
R- <i>Anthyllis vulneraria</i> L.		.	1	.	.	+	+	.	.	.	.	.	II ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles													
<i>Eryngium campestre</i> L.		+	1	1	1,2	1,2	1	.	1	1	+	+	V ⁺¹
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.		+	1	+	+	.	1	.	+	.	.	.	III ⁺¹
<i>Scabiosa columbaria</i> L.		1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.		.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	.	II ¹
<i>Lotus corniculatus</i> L.		.	.	.	.	1	1	.	1,2	1	1	.	III ¹
<i>Vicia lutea</i> L.		.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	+	II ⁺¹
<i>Hypericum perforatum</i> L.		.	.	.	+	+	+	.	.	.	+	+	III ⁺
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		.	.	+	.	1	.	.	.	+	.	+	II ⁺¹
<i>Poa bulbosa</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	I ¹⁻²
<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop.		+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles													
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.		.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
<i>Galium verum</i> L.		.	.	+	.	.	+	.	1	.	.	.	II ⁺¹

Tableau extrait de : Le Hénaff P.- M., Galliot J.-N, Le Gloanec V., Ragache Q. 2021 - Végétations agropastorales du Massif central - Catalogue phytosociologique. Conservatoire botanique national du Massif central, 528 p.

	Numéro relevé	222821	222822	222823	222824	222825	222826	343389	386052	386054	386055	386056	SYNTHESE
		930	800	580	680	780	900	535	520	520	485	606	
	Altitude (m)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	45	nd	nd	nd	nd	667
	Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	S	nd	nd	nd	nd	45
	Exposition							S					
	Surface (m²)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	9	nd	nd	nd	nd	9
	Recouvrement total (%)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	60	nd	nd	nd	nd	60
	Nombre de taxons	21	26	26	22	26	22	15	21	20	19	23	22
	<i>Saxifraga granulata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
R-	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	.	+	.	1	1	1	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Orobancha alba</i> Stephan ex Willd.	.	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	II ⁺
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles													
	<i>Asperula cynanchica</i> L.	.	1,2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ononis spinosa</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Autres taxons													
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	1	II ¹
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J.Presl & C.Presl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	I ²
	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	I ²
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
	<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski	.	1	.	.	.	.	.	+	1	.	.	II ⁺¹
	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces annuelles													
	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Veronica arvensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1	II ⁺¹
	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium arvense</i> L.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	.	.	+	.	+	.	.	1	.	1	.	II ⁺¹
	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	II ⁺
	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	I ⁺¹
	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Draba verna</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Ononis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Vicia</i> L.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Echium vulgare</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺