

Ajugo genevensis-Festucetum valesiacae

Billy ex Loiseau & Felzines 2010

		222967	222978	222979	222980	222981	222982	318460	SYNTHESE
Numéro relevé		330	330	300	300	330	280	320	411
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition		nd	nd	nd	nd	nd	nd	30	30
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	85	85
Recouvrement total (%)		28	30	30	18	20	13	54	27
Nombre de taxons		28	30	30	18	20	13	54	27
Combinaison caractéristique									
<i>Festuca</i> gr. <i>valesiaca</i>		1,2	+	+	4	3	1	1,2	V ⁺⁴
<i>Medicago minima</i> (L.) L.		1	1,2	1	1	2	3	2,2	V ¹⁻³
<i>Ajuga genevensis</i> L.		.	1	+	1	1	.	+2	IV ⁺¹
<i>Eryngium campestre</i> L.		1	+	+	+	.	.	+	IV ⁺¹
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.		+	+	+	.	.	.	+2	III ⁺
<i>Potentilla verna</i> L.		1	+	1	+	1	1	2,3	V ⁺²
<i>Trifolium striatum</i> L.		1,2	1	1,2	.	.	2	1,1	IV ⁺²
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.		+	+	.	+	.	.	+2	II ⁺
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres									
R-	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	+	.	+	1	.	+	2,2	IV ⁺²
	<i>Sedum rupestre</i> L.	.	+	1	.	.	.	+2	II ⁺¹
	<i>Sedum album</i> L.	.	.	1	.	.	.	2,2	II ¹⁻²
	<i>Sedum acre</i> L.	.	+	+	.	.	.	1,2	II ⁺¹
	<i>Koeleria</i> gr. <i>pyramidata</i>	.	1	+	.	.	.	1,3	II ⁺¹
	<i>Thymus</i> gr. <i>praecox</i>	.	.	.	.	.	.	+2	I ⁺
	<i>Artemisia campestris</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	+	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres									
	<i>Thymus</i> gr. <i>pulegioides</i>	.	.	1,2	.	.	1	.	II ¹
	<i>Rumex acetosella</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Scleranthus perennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Ci	<i>Galium album</i> Mill.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à moyennement fertiles									
Ci	<i>Trifolium incarnatum</i> L. var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	1	1,2	+	.	.	.	+	III ⁺¹
C	<i>Scrophularia canina</i> L.	1	.	+	.	.	.	.	I ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles									
	<i>Poa bulbosa</i> L.	1	2	2	+	1	.	+2	IV ⁺²
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	+	+	+	.	+	.	.	III ⁺
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	.	+	.	.	.	+2	I ⁺
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Cerastium arvense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
C	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	2,3	I ²
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles									
	<i>Galium verum</i> L.	1	+	+	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Saxifraga granulata</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Ci	<i>Salvia pratensis</i> L.	.	.	.	+	1	.	.	I ⁺¹
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles									
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	.	+	.	.	1	.	+	III ⁺¹
	<i>Ononis spinosa</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Elytrigia</i> Desv.	+	1	.	.	.	.	1,2	II ⁺¹
Espèces à large amplitude									
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	1,2	2	1	+	+	.	+	V ⁺²
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	1	.	.	.	+	.	1,2	II ⁺¹
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺²
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	1,3	I ¹
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	.	.	.	.	.	.	2,2	I ²
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces annuelles									
	<i>Aira caryophylla</i> L.	1	1	.	+	.	.	+	III ⁺¹
	<i>Draba verna</i> L.	.	.	+	.	+	1	+	II ⁺¹

Numéro relevé		222967	222978	222979	222980	222981	222982	318460	SYNTHESE
Altitude (m)		330	330	300	300	330	280	320	411
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition									
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	30	30
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	85	85
Nombre de taxons		28	30	30	18	20	13	54	27
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray		1,2	+	1	+	.	.	.	II ⁺¹
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		.	+	1	.	1	+	1,1	III ⁺¹
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis		+	+	.	.	+	.	1,1	III ⁺¹
<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski		.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.		.	.	.	.	.	+	+	I ⁺
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.		.	.	1	.	.	1	.	I ¹
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.		.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Aphanes australis</i> Rydb.		.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Trifolium glomeratum</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Trifolium arvense</i> L.		.	.	.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood		+	.	.	.	.	.	r,2	I ^{r++}
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel		.	.	.	.	.	.	1,1	I ⁺¹
<i>Myosotis</i> gr. <i>discolor</i>		+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Hypochaeris glabra</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.		.	+	.	.	+	.	+	II ⁺
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.		.	.	.	.	.	.	.	I ²
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.		.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Veronica arvensis</i> L.		.	.	.	.	.	.	+	II ⁺
<i>Scleranthus annuus</i> L.		.	.	.	.	.	.	1,2	II ¹
<i>Geranium molle</i> L.		.	.	.	+	+	.	+	II ⁺
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.		.	.	+	.	.	.	.	II ⁺¹
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz		.	+	+	.	.	.	.	II ⁺
Bryophytes									
<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr		.	.	.	.	.	.	3,3	I ³
<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch.		.	.	.	.	.	.	r	I ^r
<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.		.	.	.	.	.	.	1,2	I ¹
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.		.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Entodon concinnus</i> (De Not.) Paris		.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.		.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.		.	.	.	.	.	.	+2	I ⁺
<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.		.	.	.	.	.	.	+2	I ⁺
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. s.l.		.	.	.	.	.	.	1,2	I ¹
Autres taxons									
<i>Agrostis stolonifera</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Filago germanica</i> L.		+	.	.	.	1	.	.	II ⁺¹
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.		.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel		.	.	.	.	.	.	+2	I ⁺
<i>Spergula pentandra</i> L.		.	.	.	.	.	.	i	I ⁱ⁺⁺
<i>Astragalus hamosus</i> L.		+	2	.	.	+	.	.	II ⁺²
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.		.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		.	.	.	.	.	.	2,2	I ²
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.		1	.	.	.	.	.	r	I ^{r-1}
<i>Viola arvensis</i> Murray		.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta		.	.	.	.	.	.	+2	I ⁺
<i>Potentilla</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Echium vulgare</i> L.		.	.	.	.	.	.	+	I ⁺