

Sedo sexangularis-Thymetum pulegioidis

Billy ex Loiseau & Felzines 2010

		281853	281855	281933	281938	311590	311595	311596	311598	311599	318435	318444	318446	318455	SYNTHESE
Numéro relevé		260	260	260	260	280	280	280	290	290	265	265	265	265	271
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition		8	30	20	20	nd	nd	nd	nd	nd	12	15	10	15	16
Surface (m²)		80	95	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	90	90	95	nd	90
Recouvrement total (%)		21	30	22	22	19	18	19	23	21	47	43	47	31	28
Nombre de taxons		21	30	22	22	19	18	19	23	21	47	43	47	31	28
Combinaison caractéristique															
C	<i>Sedum rupestre</i> L.	2,2	2,2	.	2,2	1	+	+	+	1	2,2	1,1	2,2	2,2	V ⁺²
	<i>Sedum sexangulare</i> L.	.	.	.	.	2	1,2	1,2	1	+	2,3	2,2	2,2	2,2	IV ⁺²
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	+	2,2	2,2	2,2	1	1	1	+	.	1,1	1,1	1,1	.	IV ⁺¹
	<i>Thymus gr. pulegioides</i>	1,2	2,3	.	+2	2	2	1,2	1	1,2	2,3	3,3	2,2	1,3	V ¹⁻³
	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	+	1,1	3,3	2,2	1	1	+	1	1	2,2	1,1	1,2	2,2	V ⁺³
	<i>Eryngium campestre</i> L.	r	+	1,1	r	+	1	+	+	.	+2	+	1,1	.	IV ^{r-1}
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	r	1,1	.	.	.	1	.	.	+	.	+2	+2	.	III ^{r-1}
	<i>Asperula cynanchica</i> L.	.	2,2	.	+2	1,2	1	1,2	.	.	1,1	1,1	+	.	III ⁺²
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres															
R-	<i>Koeleria gr. pyramidata</i>	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	I ⁺
	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	.	.	2,3	1,2	.	.	.	.	.	r,2	.	1,2	1,1	II ^{r-2}
	<i>Sedum album</i> L.	.	.	.	3,3	1	1	.	.	.	.	.	+2	+2	II ⁺³
	<i>Artemisia campestris</i> L.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	+3	.	.	r	II ^{r+}
	<i>Potentilla gr. argentea</i>	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	+	II ⁺²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres															
	<i>Potentilla verna</i> L.	4,5	4,5	3,3	3,3	1	1	.	+	.	2,2	2,2	2,2	2,2	IV ⁺⁴
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	1,2	+	.	.	II ⁺¹
	<i>Rumex acetosella</i> L.	.	+	.	.	+	.	.	1	1	1,2	r,2	+2	1,2	III ^{r-1}
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à moyennement fertiles															
Ci	<i>Trifolium incarnatum</i> L. var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	I ⁺
	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	i	i	.	II ^{r-i}
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles															
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	i	r,2	.	.	II ^{r+}
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill., 1754	.	.	.	.	.	.	1,2	+	1	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	.	.	.	1	+	+	1	1	r	r	r	.	III ^{r-1}
	<i>Poa bulbosa</i> L.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	r,2	.	1,1	+2	II ^{r-1}
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles															
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	.	.	1	1,2	1	.	.	.	.	.	II ¹
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	1	1	+	+	.	+	III ⁺¹
Espèces à large amplitude															
	<i>Achillea millefolium</i> L.	2,2	2,2	3,3	+	1	1	1	1	1	+2	1,2	.	r,2	V ^{r-3}
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	3,3	.	3,3	.	1	1	1	1	2	1,2	1,2	2,2	1,1	IV ¹⁻³
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	.	.	.	1	.	1,2	1,1	+	2,2	+	III ⁺²
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	1	1	.	.	.	i	II ⁱ⁻¹
Espèces annuelles															
	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	1,1	+2	+2	2,2	.	.	.	.	.	+	r	+	+	III ^{r-2}
	<i>Trifolium arvense</i> L.	.	+	r	1,1	.	.	.	.	.	.	+	+	1,2	III ^{r-1}
	<i>Aira caryophyllaea</i> L.	.	.	.	.	+	.	+	1	+	1,1	.	1,1	1,1	III ⁺¹
	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	.	.	.	.	.	.	+	1	1	+	+	.	i	III ⁱ⁻¹
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	+	+	II ⁺¹
	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	I ⁱ
	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1,1	+	1,1	II ⁺¹
	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	r	II ^{r+}
	<i>Geranium columbinum</i> L.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	r,2	.	I ^r
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	+	.	I ^{r+}

		281853	281855	281933	281938	311590	311595	311596	311598	311599	318435	318444	318446	318455	SYNTHESE
Numéro relevé		260	260	260	260	280	280	280	290	290	265	265	265	265	271
Altitude (m)		260	260	260	260	280	280	280	290	290	265	265	265	265	271
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition															
Surface (m²)		8	30	20	20	nd	nd	nd	nd	nd	12	15	10	15	16
Recouvrement total (%)		80	95	90	nd	nd	nd	nd	nd	nd	90	90	95	nd	90
Nombre de taxons		21	30	22	22	19	18	19	23	21	47	43	47	31	28
Bryophytes	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Sedum rubens</i> L.	2,2	.	.	3,3	.	.	.	.	.	r	.	.	.	II ^{r-3}
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	I ^r
	<i>Veronica arvensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	II ⁺
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	r,2	I ^r
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. s.l.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	2,2	2,2	.	II ²
	<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,3	.	.	I ¹
	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1,1	.	II ⁺¹
	<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	2,2	.	I ¹⁻²
	<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	2,2	.	I ²
	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	I ¹
	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Autres taxons	<i>Rhytidium rugosum</i> (Ehrh. ex Hedw.) Kindb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,3	.	.	.	I ²
	<i>Racomitrium elongatum</i> Ehrh. ex Frisvoll	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	I ³
	<i>Trifolium striatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	I ^r
	<i>Vicia lutea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Galium verum</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Chondrilla juncea</i> L.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{r+}
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	I ^{r+}
	C <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	I ⁱ
	C <i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	1,1	.	2,2	.	.	.	.	.	.	r	+2	.	.	II ^{r-2}
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ⁱ⁻¹
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	r	r,2	II ^r
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I ^r
	<i>Portulaca</i> gr. <i>oleracea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺²
	<i>Ulmus minor</i> Mill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	I ¹
	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ¹
	<i>Rosa canina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	i	i	.	II ⁱ⁺
	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	I ⁺
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	I ¹
	<i>Draba verna</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1,1	r	II ^{r-1}
	<i>Peltigera</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
	<i>Elytrigia</i> Desv.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r,2	+2	.	II ^{r+}
	<i>Echium vulgare</i> L.	.	1,2	1,1	+	.	.	.	.	.	1,2	+	.	.	II ⁺¹
	<i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	I ⁺