

Teucrio montani-Fumanetum procumbentis

(Pabot 1940) J.-M. Royer 1987

																SYNTHESE
Numéro relevé		374180	374189	374193	374725	374727	374728	374729	394554	394559	394561	484579	484596	650656		
Altitude (m)		168	169	168	168	168	168	168	180	180	180	170	169	195	173	
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Exposition																
Surface (m²)		25	20	25	2	2	2	2	30	30	20	6	5	nd	14	
Recouvrement total (%)		95	95	80	100	100	98	95	95	80	100	98	98	50	91	
Nombre de taxons		36	36	33	25	28	24	17	25	21	29	26	26	25	27	
Combinaison caractéristique																
Festuca marginata (Hack.) K.Richt.		1,1	2,2	2,2	2,2	+	+	+	1,2	+2	2,3	3,3	3,3	.	V ⁺³	
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.		2,2	4,4	3,3	+	1,2	+	+	1,2	.	3,3	1,1	3,3	+	V ⁺⁴	
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin		2,2	1,1	2,2	+	1,2	+	+	2,3	+2	2,3	2,2	.	1,1	V ⁺²	
Carex liparocarpos Gaudin		1,1	.	1,1	r	+	+2	+	2,2	1,1	1,1	2,2	.	1,1	IV ^{r-2}	
Teucrium montanum L.		1,1	.	.	.	.	2,3	3,3	2,3	.	+	.	.	2,1	III ⁺³	
Euphorbia seguieriana Neck.		.	+	.	+	r	.	.	r	+	1,1	.	1,1	.	III ^{r-1}	
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.		2,2	.	+	+2	+	1,1	2,2	.	.	.	2,2	.	1,1	III ⁺²	
Ononis natrix L.		+	.	1,1	.	.	.	.	+	+	r	i	.	.	III ^{r-1}	
Petrorhagia saxifraga (L.) Link		1,1	.	.	.	.	.	+	1,1	+	1,1	.	.	+	III ⁺¹	
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.		+	.	1,1	+	+	+2	.	.	.	.	r,3	.	.	III ^{r-1}	
Helianthemum canum (L.) Baumg.		+	.	.	.	+	1,1	1,1	.	.	.	.	.	1,1	II ⁺¹	
Helichrysum stoechas (L.) Moench		.	.	.	.	.	.	.	.	3,3	+2	.	.	1,1	II ⁺³	
Espèces des milieux secs très maigres																
Thymus gr. praecox		2 cf	2 cf	2,2	+	.	+	+2	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	.	IV ⁺²	
Helianthemum apenninum (L.) Mill.		.	.	.	.	.	.	.	2,3	.	1,1	.	.	1,1	II ⁻²	
Hippocrepis comosa L.		1,1	2,2	1,1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺²	
Teucrium chamaedrys L.		2,2	2,2	.	.	.	1,1	.	2,2	.	1,2	2,2	+3	1,2	III ⁺²	
Stipa pennata L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	I ²	
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres																
Sedum ochroleucum Chaix		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	I ⁺	
Sedum rupestre L.		1,1	.	1,1	1,1	2,2	1,1	+	.	.	.	.	.	.	III ⁺²	
Artemisia campestris L.		2,2	.	2,2	.	.	1,1	+	.	.	1,1	.	.	+	III ⁺²	
Sedum album L.		.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	I ²	
Stachys recta L.		1,1	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	II ¹	
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres																
C	Oreoselinum nigrum Delarbre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ¹	
C	Sedum sexangulare L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	II ⁺	
	Globularia bisnagarica L.	.	.	i	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	1,2	II ⁻¹	
	Thesium humifusum DC.	1,1	+	1,1	+2	.	+	+	+	.	1,1	+	.	1,1	IV ⁺¹	
	Helianthemum nummularium (L.) Mill.	1,1	1,1	1,1	+	2,2	+	.	1,2	1,1	.	2,2	1,1	.	IV ⁺²	
	Potentilla verna L.	.	.	1,1	+	+	1,1	.	1,1	+	.	2,2	2,2	.	III ⁺²	
	Inula montana L.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	+	I ⁺²	
	Poterium sanguisorba L.	1,1	1,1	+	.	.	.	.	r	.	.	r	.	1,1	III ^{r-1}	
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles																
	Eryngium campestre L.	1,1	1,1	1,1	+	+	+	1,1	+	+	2,2	2,2	1,1	+	V ⁺²	
	Hypericum perforatum L.	+	1,1	+	r	.	.	.	r	i	+	.	.	.	III ^{r-1}	
	Poa bulbosa L.	1,1	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	III ⁺¹	
	Galium corrudifolium Vill.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	1,1	.	.	1,1	II ¹	
	Euphorbia cyparissias L.	+	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	II ⁺¹	
	Origanum vulgare L.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹	
	Poa bulbosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹	
	Hypericum perforatum L.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	1,1	+	.	II ^{r-1}	
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles																
	Asperula cynanchica L.	1,1	1,1	.	.	i	.	.	+	.	1,1	.	.	.	II ⁻¹	
	Briza media L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	3	I ⁺	
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles																
	Vicia gr. sativa	.	.	.	+	r	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{r+}	
	Echium vulgare L.	1,1	.	1,1	.	.	.	.	r	+	.	i	1,1	.	III ^{r-1}	
Espèces à large amplitude																
	Medicago sativa L.	1,1	1,1	1,1	.	.	+	.	.	.	+	1,1	2,2	.	III ⁺²	
	Plantago lanceolata L.	1,1	1,1	1,1	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	III ⁺¹	
	Cynodon dactylon (L.) Pers.	1,1	1,1	2,2	2,2	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	III ⁻¹⁻²	
Espèces annuelles																
	Medicago minima (L.) L.	1,1	1,1	1,1	1,2	2,2	+	+	.	.	.	1,2	1,1	.	IV ⁺²	
	Arenaria serpyllifolia L.	1,1	1,1	1,1	.	+	+	.	.	.	.	.	i	.	III ⁻¹	
	Trifolium campestre Schreb.	1,1	+	1,1	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	II ^{r-1}	
	Veronica arvensis L.	.	1,1	+	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	II ⁺¹	
Autres taxons																
	Centaurea scabiosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r	

		Numéro relevé	374180	374189	374193	374725	374727	374728	374729	394554	394559	394561	484579	484596	500656	SYNTHÈSE
		Altitude (m)	168	169	168	168	168	168	168	180	180	180	170	169	195	173
		Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
		Exposition														
		Surface (m²)	25	20	25	2	2	2	2	30	30	20	6	5	nd	14
		Recouvrement total (%)	95	95	80	100	100	98	95	95	80	100	98	98	50	91
		Nombre de taxons	36	36	33	25	28	24	17	25	21	29	26	26	25	27
Ci	<i>Scabiosa columbaria</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	r	.	i	.	.	.	i ^{r-i}
	<i>Salvia pratensis</i> L.		.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ²
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.		.	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	i ⁺²
	<i>Coronilla varia</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	i ⁺
	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	i ⁺
C	<i>Potentilla reptans</i> L.		.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Dactylis glomerata</i> L.		.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.		.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace		.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	i ^r
	<i>Leontodon crispus</i> Vill.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	i ⁺
	<i>Teucrium botrys</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelén ex Carreras		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Melampyrum arvense</i> L.		.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	i ²
	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng		.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	i ⁺
	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Reseda lutea</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	i ¹
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.		.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Prunus mahaleb</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.		1,1	.	.	.	.	i	.	.	.	.	+	.	.	ii ⁺¹
	<i>Reseda phyteuma</i> L.		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Scorzonera hirsuta</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	i ¹
	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck		.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Phleum arenarium</i> L.		1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	i ⁺
	<i>Biscutella laevigata</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	i ⁺
	<i>Linum tenuifolium</i> L.		.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	<i>Crepis foetida</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Quercus pubescens</i> Willd.		.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.		.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	i ¹
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i> (Lindb.f.) Dahlst.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
	<i>Dianthus saxicola</i> Jord.		.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	i ¹
	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC.		.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	i ^r
	<i>Vicia lathyroides</i> L.		.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.		.	.	.	i	+	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺⁺
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	i ^r
	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel		.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	i	.	.	i ^{r-i}
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.		.	.	.	i	.	r	.	.	.	.	.	.	.	i ^{r-i}
	<i>Allium</i> L.		i	.	+	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	ii ⁺⁺
	<i>Cerastium</i> L.		1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Alyssum</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	i ⁺
	<i>Orobancha</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	i ⁺
	<i>Centaurea</i> L.		.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ¹
	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.		.	.	.	r	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	i ^{r-1}
	<i>Erigeron canadensis</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i ⁺
	BRYOPHYTA sp.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	i ^s