

Briza mediae-Agrostietum capillaris Thébaud 2008

		47917	384662	384667	489502	384672	555709	574497	574539	574549	SYNTHESE
Numéro relevé		47917	384662	384667	489502	384672	555709	574497	574539	574549	SYNTHESE
Altitude (m)		1 480	1 400	1 290	1 530	1 270	1 295	1 336	1 284	1 282	1 352
Pente relevé (°)		40	nd	nd	10	nd	nd	15	15	20	20
Exposition					S			NE	N	N	
Surface (m²)		40	nd	nd	20	nd	20	20	nd	nd	25
Recouvrement total (%)		95	nd	nd	100	nd	100	95	nd	nd	98
Nombre de taxons		25	28	27	26	30	31	25	32	24	28
Combinaison caractéristique											
M	<i>Viola lutea</i> Huds.	1	+	+	.	.	.	2,2	1,1	2,2	IV ⁺²
	<i>Briza media</i> L.	1,2	1	.	2	.	.	.	1,1	+	III ⁺²
M	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	2	1	2	.	+	.	1,1	1,1	2,2	IV ⁺²
M	<i>Scorzoneroïdes pyrenaica</i> (Gouan) Holub	.	1	+	1	1,2	1	1,1	1,1	.	IV ⁺¹
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2,2	1	2	1	.	3	2,2	1,1	.	IV ¹⁻³
	<i>Rumex acetosa</i> L.	.	+	.	+	+	i	1,1	+	.	IV ⁱ⁻¹
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	+	1,1	1,1	1,1	III ⁺¹
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	+	.	+	2	.	2,2	.	III ⁺²
	<i>Stellaria graminea</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	1,1	+	II ⁺¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles											
	<i>Nardus stricta</i> L.	1,2	1,2	1,2	2	1	1	r,3	2,2	2,2	V ^{r-2}
	<i>Galium saxatile</i> L.	.	1	1	1	1	2	2,2	2,2	1,1	V ¹⁻²
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	1	2	+	1	1	1	.	1,1	.	IV ⁺²
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	.	.	+	3	1	2	2,2	.	3,3	IV ⁺³
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	+	+	.	.	+	.	1,1	1,1	1,1	IV ⁺¹
M	<i>Arnica montana</i> L.	.	.	+	.	+	.	+,3	.	.	II ⁺
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	2	.	.	2,2	3,3	.	II ²⁻³
	<i>Serratula tinctoria</i> L.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	II ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres											
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	1	1	1	1	1	.	1,1	1,1	.	IV ¹
M	<i>Thesium alpinum</i> L.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	III ⁺
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	1	+	.	.	i	.	1,1	.	III ⁱ⁻¹
M	<i>Potentilla aurea</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	2,2	2,2	II ⁺²
	<i>Thymus pulegioides</i> L.	2,2	.	.	1	.	.	.	.	.	II ¹⁻²
	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) M érat	.	.	.	.	+	+	.	.	.	II ⁺
M	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	1	.	.	.	.	+	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	.	.	.	.	.	1	.	.	1,1	II ¹
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Genista sagittalis</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles											
	<i>Veronica officinalis</i> L.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	II ⁺
M	<i>Knautia basaltica</i> Chass. & Szabó	.	.	.	2	.	.	.	.	+ cf	II ²
	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	I ²
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles											
M	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	.	1,2	1	.	1,2	3	1,1	2,2	2,2	IV ¹⁻³
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	4,3	.	1	.	1	+	1,1	+	.	IV ⁺⁴
M	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	.	.	.	.	+	.	1,1	1,1	1,1	III ⁺¹
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	.	1	.	.	+	i	.	1,1	+	III ⁱ⁻¹
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	1	+	.	1	1	.	.	.	III ⁺¹
	<i>Carex pilulifera</i> L.	3,3	1	.	.	.	.	1,1	.	.	II ¹⁻³
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles											
	<i>Festuca gr. rubra</i>	2,2 cf	3	1	.	1	1 cf	.	.	2,2 cf	IV ¹⁻³
M	<i>Centaurea nigra</i> L.	.	.	1,2	.	1	1	.	1,1	+	III ⁺¹
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	+	.	.	.	.	1,1	1,1	+	III ⁺¹
M	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	.	.	.	.	1,2	+	.	.	.	II ⁺¹
F	<i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à humides, peu fertiles à fertiles											
	<i>Ajuga reptans</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	II ⁺¹
M	<i>Alchemilla gr. vulgaris</i>	.	.	.	+	.	.	.	1,1 cf	.	II ⁺¹

		47917	384662	384667	489502	384672	555709	574497	574539	574549	SYNTHESE
Numéro relevé											
Altitude (m)		1 480	1 400	1 290	1 530	1 270	1 295	1 336	1 284	1 282	1 352
Pente relevé (°)		40	nd	nd	10	nd	nd	15	15	20	20
Exposition					S			NE	N	N	
Surface (m²)		40	nd	nd	20	nd	20	20	nd	nd	25
Recouvrement total (%)		95	nd	nd	100	nd	100	95	nd	nd	98
Nombre de taxons		25	28	27	26	30	31	25	32	24	28
M	<i>Trollius europæus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I ¹
M	<i>Veratrum album</i> L.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	I ²
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles											
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	.	1	.	.	1	.	1,1	2,2	1,1	III ¹⁻²
M	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	I ²
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres											
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	.	1	.	1	.	.	.	.	.	II ¹
	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ¹
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	I ²
Espèces des landes											
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	1	+	.	1	.	+	.	.	.	III ⁺¹
M	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1	.	.	1	1,2	.	.	.	.	II ¹
	<i>Genista pilosa</i> L.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	II ⁺
Espèces à large amplitude											
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	2,2	1	1	1	1	1	1,1	2,2	.	V ¹⁻²
	<i>Stellaria holostea</i> L.	.	.	+	+	1	.	+	.	.	III ⁺¹
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	1,1	.	II ⁺¹
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	I ²
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres											
S	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	1	.	.	+	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	1	.	.	.	.	i	.	.	.	II ⁱ⁻¹
Espèces compagnes											
	<i>Hieracium</i> L.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Salix repens</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Carex pallescens</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Galium verum</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Solidago virgaurea</i> L.	.	.	.	+ cf	.	i	.	.	.	I ⁱ
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Solidago</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	I ⁱ
	<i>Melampyrum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I ¹
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I ^r
Bryophytes											
	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	I ²