

		341080	341112	341121	341155	651722	651725	651727	651729	651730	651732	651734	651735	SYNTHESE
Numéro relevé														
Altitude (m)		1 520	1 580	1 550	1 670	1 780	1 620	1 850	1 830	1 730	1 710	1 630	1 730	1 683
Pente relevé (°)		10	10	5	5	10	25	10	15	5	5	nd	5	10
Exposition		NO	O	NO	NE	NE	O	SSE	NO	SE	N	nd	ONO	
Surface (m²)		12	15	5	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	10
Recouvrement total (%)		100	100	100	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100
Nombre de taxons		25	26	25	27	23	29	26	13	17	16	18	18	22
Combinaison caractéristique														
S	<i>Agrostis rupestris</i> All.	1,1	r,2	1,1	1,2	+	+	2	+	1	2	2	2	V ^{r-2}
S	<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	1,1	1,2	1,1	1,1	+	+	1	.	.	+	+	+	V ⁺¹
	<i>Nardus stricta</i> L.	3,3	2,2	3,3	2,2	3	+	2	4	1	4	4	3	V ⁺⁴
M	<i>Scorzoneroides pyrenaica</i> (Gouan) Holub	2,2	2,2	2,2	2,2	3	3	4	3	3	2	3	4	V ²⁻⁴
M	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	2,2	.	+	1,1	+	+	1	2	+	+	+	+	V ⁺²
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	1,1	+	1,1	1,1	+	1	1	.	.	+	.	+	IV ⁺¹
M	<i>Trifolium alpinum</i> L.	2,2	+2	1,2	i,2	.	+	+	+	+	.	+	+	IV ⁺²
M	<i>Potentilla aurea</i> L.	2,2	1,2	1,1	2,2	.	1	+	.	.	.	.	.	III ⁺²
S	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	.	.	.	.	+	+	1	+	.	.	+	.	III ⁺¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles														
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	r	2,2	r	1,1	3	1	3	2	3	3	3	3	V ^{r-3}
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	1,1	1,1	+	2,2	+	3	+	.	1	2	1	1	V ⁻³
	<i>Galium saxatile</i> L.	2,2	2,2	2,2	2,2	.	+	.	.	2	3	+	2	IV ⁺³
M	<i>Arnica montana</i> L.	.	.	.	.	+	+	+	+	+	.	.	+	II ⁺
M	<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>lanceolata</i> (Lapeyr.) J.-M.Tison	.	.	.	r,2	.	+	.	.	.	.	.	.	I ^{r++}
	<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F.Towns.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres														
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	2,2	+2	2,2	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺²
S	<i>Anemone scherfelii</i> Ullep.	.	.	.	.	.	+	+	2	.	.	+	.	II ⁺²
S	<i>Helictochloa versicolor</i> (Vill.) Romero Zarco	.	.	.	.	+	.	1	+	.	.	+	.	II ⁺¹
M	<i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H.Loos	.	.	.	i	+	.	.	.	+	.	+	+	II ⁺⁺
	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
S	<i>Cerastium alpinum</i> L.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Thesium alpinum</i> L.	.	r	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{r-i}
S	<i>Phleum alpinum</i> L.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
S	<i>Androsace halleri</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles														
	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	1,1	+	+	1,1	+	1	1	1	.	+	1	1	V ⁺¹
M	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Lotus comiculatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
S	<i>Carex vaginata</i> Tausch	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles														
M	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	2,2	2,2	2,2	2,2	+	+	1	.	+	+	.	+	V ⁺²
M	<i>Mutellina adonidifolia</i> (J.Gay) Gutermann	.	1,2	.	.	1	+	+	+	1	.	.	.	III ⁺¹
	<i>Carex pilulifera</i> L.	1,2	.	1,1	.	.	.	+	.	.	.	+	.	II ⁺¹
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	.	1,2	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	.	i	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺⁺
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Viola canina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles														
	<i>Festuca rubra</i> L.	1,1	2,2	+1,cf	1,1 cf	1	2	1	1	2	+	2	2	V ⁺²
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à humides, peu fertiles à fertiles														
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	+2	1,1	+	+	+	+	+	.	+	.	.	.	IV ⁺¹
M	<i>Trollius europaeus</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Luzula desvauxii</i> Kunth	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres														
	<i>Viola palustris</i> L.	1,1	1,2	+	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres														
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	+2	+2	r,2	.	.	+	+	.	.	.	.	.	II ^{r++}
S	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des landes														
M	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1,2	+	+	+	2	2	+	+	.	1	2	.	V ⁺²
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	.	+	r	+2	+	.	+	.	.	.	+	+	III ^{r++}
M	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces à large amplitude														
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	1,1	2,2	1,1	+	1	2	.	.	2	1	.	1	IV ⁺²
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	+	1,2	+	+	.	.	.	1	3	.	1	IV ⁺³
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺