

Polygalo vulgaris*-*Caricetum paniceae Misset 2002

	650758	661280	SYNTHESE
Numéro relevé			
Altitude (m)	nd	528	528
Pente relevé (°)	3	nd	3
Exposition	E		
Surface (m²)	25	8	17
Recouvrement total (%)	95	100	98
Nombre de taxons	33	24	29
Combinaison caractéristique			
<i>Carex panicea</i> L.	1	2,2	IV ¹⁻²
<i>Agrostis canina</i> L.	2	1,1	IV ¹⁻²
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	1	2,2	IV ¹⁻²
<i>Carex flacca</i> Schreb.	2	.	II ²
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	2	.	II ²
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	1	.	II ¹
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	1	.	II ¹
<i>Polygala vulgaris</i> L.	+	.	II ⁺
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	2	2,2	IV ²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles			
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	2	r	IV ^{r-2}
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	2,3	.	II ²
<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	.	II ¹
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1	.	II ¹
<i>Galium verum</i> L.	1,2	.	II ¹
<i>Briza media</i> L.	1	.	II ¹
<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	+	.	II ⁺
<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	.	II ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles			
<i>Prunella vulgaris</i> L.	1	+	IV ⁺¹
<i>Centaurea jacea</i> L.	2,3	.	II ²
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	1	.	II ¹
<i>Festuca rubra</i> L.	.	1,1	II ¹
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles			
p <i>Scorzoneroidea autumnalis</i> (L.) Moench	.	1,1	II ¹
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	.	r	II ^r
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres			
<i>Carex pallescens</i> L.	1	.	II ¹
<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West	+	.	II ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles			
<i>Carex leporina</i> L.	.	r	II ^r
<i>Scorzonera humilis</i> L.	r	+	IV ^{r+}
Espèces des milieux humides, très maigres à peu fertiles			
<i>Trochardis verticillatum</i> (L.) Raf.	.	1,1	II ¹
<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	.	+	II ⁺
<i>Carex pulicaris</i> L.	.	r	II ^r
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles			
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	+	r	IV ^{r+}
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	r	.	II ^r
<i>Juncus effusus</i> L.	+	.	II ⁺
<i>Ranunculus flammula</i> L.	.	+	II ⁺
Espèces à large amplitude			
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	2	+	IV ⁺²
<i>Ranunculus acris</i> L.	1	1,1	IV ¹
<i>Holcus lanatus</i> L.	1	r	IV ^{r-1}
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+	r	IV ^{r+}
<i>Plantago lanceolata</i> L.	2	.	II ²
<i>Rumex acetosa</i> L.	1	.	II ¹
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	+	.	II ⁺
p <i>Cynosurus cristatus</i> L.	.	1,1	II ¹
<i>Trifolium pratense</i> L.	.	+	II ⁺
<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	+	II ⁺
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	r	II ^r