

Lathyro tuberosi-Arrhenatheretum elatioris

J.-M. Royer in J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006

	Numéro relevé	640614	640616	640672	640695	663034	640726	640809	640844	SYNTHESE
		Altitude (m)	Pente relevé (°)	Exposition	Surface (m²)	Recouvrement total (%)	Nombre de taxons			
		277	233	183	318	nd	256	175	181	232
		nd	nd	nd	nd	10	nd	nd	nd	10
				E						
		30	7	8	12	20	14	10	7	14
		100	100	100	100	85	100	100	100	98
		29	28	31	42	28	36	35	28	32
Combinaison caractéristique										
	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	3	4	3	3	1,2	4	2	3	V ¹⁻⁴
Ci	<i>Galium album</i> Mill.	2	1	2	2	.	2	.	2	IV ¹⁻²
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	4	2	2	4	2,2	4	3	3	V ²⁻⁴
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	2	1	1	2	+	2	2	2	V ¹⁻²
	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort.	.	.	.	2	2,2	.	2	.	II ²
	<i>Campanula rapunculus</i> L.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	I ¹
	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	.	1	1	.	.	1	.	.	II ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres										
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	.	+	2	1	.	.	.	+	II ¹⁻²
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	+	+	2	+	1,1	.	+	+	IV ¹⁻²
C	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles										
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	.	1	1	1,2	.	.	.	II ¹
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	.	+	.	.	.	1	.	+	II ¹⁻¹
	<i>Eryngium campestre</i> L.	.	.	.	1	+	.	.	.	II ¹⁻¹
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Origanum vulgare</i> L.	.	2	.	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill., 1754	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	1	1	2	.	+	+	.	III ¹⁻²
	<i>Verbena officinalis</i> L.	.	.	.	.	+	.	+	.	II ⁺
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles										
R-	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	2	2	3	.	.	1	3	.	III ¹⁻³
	<i>Galium verum</i> L.	.	.	.	+	2,2	1	+	.	III ¹⁻²
	<i>Primula veris</i> L.	1	.	.	1	.	.	.	.	II ¹
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	+	1	.	+	2	2	2	IV ¹⁻²
	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	1	2	2	2	2,2	2	2	2	V ¹⁻²
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles										
	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	2	1	.	2	1,2	.	.	2	III ¹⁻²
F	<i>Vicia cracca</i> L.	.	.	2	.	.	1	1	.	II ¹⁻²
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles										
	<i>Ononis spinosa</i> L.	.	.	.	.	+	2	.	.	II ¹⁻²
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	1	1	.	.	.	.	II ¹
	<i>Genista tinctoria</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles										
	<i>Centaurea jacea</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ¹
C F	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	1	.	1	2	1,2	2	2	.	IV ¹⁻²
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	.	.	.	1	.	.	+	.	II ¹⁻¹
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	.	.	.	1	.	.	1	.	II ¹
	<i>Festuca rubra</i> L.	1	+	.	1	.	1	2	2	IV ¹⁻²
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles										
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	+	1	1	1	.	1	1	1	IV ¹⁻¹
	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	.	.	.	+	.	1	.	.	II ¹⁻¹
	<i>Vicia sepium</i> L.	.	.	+	1	.	.	1	.	II ¹⁻¹
	<i>Carex spicata</i> Huds.	+	1	+	1	.	.	+	.	III ¹⁻¹
Espèces des milieux sains à humides fertiles										
	<i>Urtica dioica</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	1	1	.	1	.	.	II ¹
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles										
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	2	2	2	2	.	2	2	1	IV ¹⁻²
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	.	.	.	.	.	.	2	1	II ¹⁻²
	<i>Carex hirta</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	.	.	.	1	.	1	1	+	III ¹⁻¹
Espèces des milieux fertiles										
	<i>Galium aparine</i> L.	1	1	.	1	.	2	+	1	IV ¹⁻²
F+	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
Espèces à large amplitude										

Numéro relevé		640614	640616	640672	640695	663034	640726	640809	640844	SYNTHESE
Altitude (m)		277	233	183	318	nd	256	175	181	232
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	10	nd	nd	nd	10
Exposition		E								
Surface (m²)		30	7	8	12	20	14	10	7	14
Recouvrement total (%)		100	100	100	100	85	100	100	100	98
Nombre de taxons		29	28	31	42	28	36	35	28	32
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.		3	2	1	2	.	2	2	2	V ¹⁻³
<i>Daucus carota</i> L.		.	.	.	.	.	1	1	+	II ⁺¹
<i>Achillea millefolium</i> L.		.	.	.	1	+	.	.	.	II ⁺¹
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	.	+	.	+	.	.	.	.	II ⁺
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke		1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Stellaria holostea</i> L.		.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	2	1	2	2	.	1	2	2	IV ¹⁻²
<i>Trifolium pratense</i> L.		+	.	.	+	.	1	.	.	II ⁺¹
<i>Trifolium repens</i> L.		1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Plantago lanceolata</i> L.		.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Rumex acetosa</i> L.		+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Ranunculus acris</i> L.		.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
<i>Galium mollugo</i> L.		.	.	.	.	1,2	.	.	.	I ¹
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
<i>Dactylis glomerata</i> L.		1	1	+	.	1,2	2	2	2	V ⁺²
<i>Holcus lanatus</i> L.		.	.	1	.	.	2	.	.	II ¹⁻²
<i>Poa pratensis</i> L.		2	1	.	.	.	1	.	2	III ¹⁻²
Espèces annuelles										
<i>Geranium dissectum</i> L.		.	.	.	.	.	.	2	1	II ¹⁻²
<i>Geranium columbinum</i> L.		.	+	.	1	.	.	+	1	III ⁺¹
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
<i>Medicago lupulina</i> L.		.	+	+	1	.	+	.	.	III ⁺¹
P++	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski	1	.	1	1	.	.	.	1	III ¹
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz		.	.	.	.	.	.	1	1	II ¹
Autres taxons										
C	<i>Allium vineale</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.		+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Geranium purpureum</i> Vill.		.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Lathyrus aphaca</i> L.		+	.	+	.	+	.	.	.	II ⁺
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.		.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Allium oleraceum</i> L.		.	.	1	.	+	.	.	.	II ⁺¹
<i>Sambucus ebulus</i> L.		.	.	.	2	.	.	.	.	I ²
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.		.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.		.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ¹
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.		.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.		.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda		.	.	.	.	.	1	1	.	II ¹
<i>Inula salicina</i> L.		+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin		.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
<i>Lathyrus nissolia</i> L.		.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.		.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
<i>Pastinaca sativa</i> L.		.	.	.	1	.	1	.	1	II ¹
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link		.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
<i>Gladiolus</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des friches										
<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>		.	.	.	.	1,2	.	.	.	I ¹
<i>Lapsana communis</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
<i>Picris hieracioides</i> L.		.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ¹
<i>Prunus spinosa</i> L.		.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ¹