

Potentillo reptantis-Menthetum suaveolentis Oberd. (1952) 1957 corr. 1983

		222772	222774	222775	222777	222779	222780	412221	412262	447741	447763	447784	SYNTHESE
Numéro relevé													
Altitude (m)		550	550	440	280	620	530	210	200	185	210	155	357
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition													
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	30	25	20	25	25	25
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	100	100	100	100	100
Nombre de taxons		22	20	13	21	17	17	30	27	15	20	24	21
Combinaison caractéristique													
C	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	1,2	2,3	1	2	.	.	4	4	2	3	4	IV ¹⁻⁴
	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	1,2	1	1,2	2	1	1,2	.	3	.	3	2	IV ¹⁻³
	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	.	1	.	1	.	.	r	r	.	.	III ^{r-1}
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	1,2	.	.	1,2	2	1,2	+	.	.	+	+	III ⁺²
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	1	1	.	1,2	1,2	1	+	1	.	.	.	III ⁺¹
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	2	2	1,2	1	1	1	.	.	.	r	2	IV ^{r-2}
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	+	.	1	2	1	1,2	.	.	.	.	.	III ⁺²
C	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	III ¹
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	1	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	III ¹
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	1,2	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	.	.	.	.	.	.	+	1	1	r	.	II ^{r-1}
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	1	.	.	.	.	r	+	.	+	.	II ^{r-1}
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles													
	<i>Ranunculus repens</i> L.	1	+	1,2	2	1	1,2	+	1	1	2	.	V ⁺²
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	1	1	3	1	1	1	.	+	.	1	1	IV ⁺³
	<i>Carex hirta</i> L.	.	1	.	+	1	1	1	.	4	2	1	IV ⁺⁴
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	II ⁺
	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à humides fertiles													
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	.	+	+	.	.	.	.	r	1	1	1	III ^{r-1}
	<i>Urtica dioica</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	1	+	II ⁺¹
	<i>Convolvulus sepium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	r	+	.	II ^{r-1}
	<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Rumex crispus</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres													
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles													
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Origanum vulgare</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
	<i>Galium verum</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	.	.	.	1,2	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains, très maigres à peu fertiles													
	<i>Ononis spinosa</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Betonica officinalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles													
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	+	I ^{r++}
	<i>Centaurea subgen. Jacea</i> (Mill.) Hayek	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles													
	<i>Stellaria graminea</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	r	+	II ^{r-1}
	<i>Equisetum arvense</i> L.	.	.	1	1	1,2	.	.	.	.	.	.	II ¹
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles													
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺

		222772	222774	222775	222777	222779	222780	412221	412262	447741	447763	447784	SYNTHESE
Numéro relevé													
Altitude (m)		550	550	440	280	620	530	210	200	185	210	155	357
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition													
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	30	25	20	25	25	25
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	100	100	100	100	100	100
Nombre de taxons		22	20	13	21	17	17	30	27	15	20	24	21
C	<i>Mentha pulegium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Juncus articulatus</i> L.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
Espèces des milieux humides, très maigres à maigres													
	<i>Equisetum palustre</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Galium uliginosum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles													
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	I ⁺¹
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
C	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	I ⁱ
Espèces à large amplitude													
	<i>Holcus lanatus</i> L.	1	.	.	.	.	1	+	3	2	2	2	III ⁺³
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	+	1	.	.	.	1	.	1	.	2	1	III ⁺²
	<i>Trifolium repens</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	II ⁺¹
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	1	1	.	.	.	+	.	+	II ⁺¹
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	.	+	1	.	r	.	.	.	.	II ^{r-1}
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	2	II ⁺²
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	r	.	+	II ^{r+}
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	I ⁺¹
F	<i>Phleum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	I ⁺¹
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	I ¹⁻²
P+	<i>Plantago major</i> L.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
F	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	I ⁺
P	<i>Lolium perenne</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
P++	<i>Bellis perennis</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I ^r
Autres taxons													
	<i>Cichorium intybus</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Stachys sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	I ⁱ
	<i>Rumex sanguineus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I ^r
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces annuelles													
	<i>Medicago lupulina</i> L.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺
Genres													
	<i>Carex</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Rubus</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r