

Galio saxatilis-Gentianetum luteae Chabrol & Reimringer ex ass. nov.

		15156	374032	340110	15160	15161	19015	389058	14697	15175	369729	14975	17891	SYNTHESE
Numéro relevé		800	680	745	840	830	710	845	670	770	705	900	650	762
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	7	nd	nd	nd	nd	nd	7
Pente relevé (°)								N						
Exposition														
Surface (m²)		nd	50	100	nd	nd	nd	100	nd	nd	100	100	nd	90
Recouvrement total (%)		nd	100	100	nd	nd	nd	100	nd	nd	100	95	nd	99
Nombre de taxons		32	19	26	28	28	35	33	19	35	28	35	27	29
Combinaison caractéristique														
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	2	+	2	3	2	1	1,1	2	1	2	2,2	+	V ⁺ -3
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	+	+	+	2	.	1,1	2	+	1	2,1	2	V ⁺ -2
	<i>Nardus stricta</i> L.	+	1	+	+	3	1	3,3	2	+	2	3,3	3	V ⁺ -3
	<i>Galium saxatile</i> L.	2	r	+	+	+	+	1,2	+	+	+	2,1	.	V ^r -2
M	<i>Arnica montana</i> L.	+	.	.	.	2	1	r	+	.	+	+2	2	IV ^r -2
	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	+	.	+	+	1	+	+1	.	+	.	.	.	III ⁺ -1
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles														
	<i>Briza media</i> L.	+	+	+	+	+	+	+1	1	+	1	1,1	.	V ⁺ -1
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	1	+	.	+	2	+	2,2	1	1	.	1,1	+	V ⁺ -2
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	3	.	.	+	+	.	2,2	.	+	.	.	.	III ⁺ -3
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	.	.	+	.	.	.	1,1	.	.	r	1,1	1	III ^r -1
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Serratula tinctoria</i> L.	+	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^r -+
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles														
	<i>Festuca rubra</i> L.	1	3 cf	.	1	1	+	+1	.	2	3 cf	2,1	1	V ⁺ -3
	<i>Stellaria graminea</i> L.	.	r	+	+	.	.	+1	.	+	.	+2	.	III ^r -+
	<i>Ajuga reptans</i> L.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	+2	.	II ⁺
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	II ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres														
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	+	.	1	1	1	1	1,1	1	+	+	1,1	2	V ⁺ -2
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	+	II ⁺ -1
	<i>Rumex acetosella</i> L.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	II ⁺
	<i>Festuca gr. ovina</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺ -1
	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à moyennement fertiles														
	<i>Veronica officinalis</i> L.	1	2	+	.	.	+	1,2	.	+	+	2,1	1	IV ⁺ -2
p-	<i>Holcus mollis</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	+2	.	II ⁺ -2
	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	I ²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles														
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	.	+	.	+	1	+1	.	.	.	+2	+	III ⁺ -1
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	.	II ⁺ -1
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles														
	<i>Polygala vulgaris</i> L.	.	r	.	.	1	.	+1	1	+	.	.	+	III ^r -1
M	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	II ⁺
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	1	.	.	.	+	.	.	.	.	r	+	.	II ^r -1
	<i>Viola canina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	I ⁺
M	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	+	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	I ⁺ -1
	<i>Carex pilulifera</i> L.	+	.	.	.	.	.	2,2	.	.	.	.	.	I ⁺ -2
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles														
	<i>Leucanthemum cf. ircutianum</i>	.	.	r	+	.	.	r	.	+	1	+	2	III ^r -2
	<i>Centaurea subgen. Jacea</i> (Mill.) Hayek	+	.	+	+	.	+	r	.	+	.	+	.	III ^r -+
M	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	1	II ⁺ -1
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres														
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	r	.	.	.	.	1	+	+	2,1	1	III ^r -2
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	I ⁺
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	I ⁺
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺ -1
	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+2	.	I ⁺
	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^r -+
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles														
	<i>Scorzonera humilis</i> L.	.	.	.	+	+	+	.	.	+	.	+2	+	III ⁺
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	1	+2	.	II ⁺ -1

		15166	374032	340110	15160	15161	19015	389058	14697	15175	369729	14975	17891	SYNTHESE
Numéro relevé														
Altitude (m)		800	680	745	840	830	710	845	670	770	705	900	650	762
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	7	nd	nd	nd	nd	nd	7
Exposition								N						
Surface (m²)		nd	50	100	nd	nd	nd	100	nd	nd	100	100	nd	90
Recouvrement total (%)		nd	100	100	nd	nd	nd	100	nd	nd	100	95	nd	99
Nombre de taxons		32	19	26	28	28	35	33	19	35	28	35	27	29
M	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres														
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+2	.	II ⁺¹
	<i>Jasione montana</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Thymus</i> sect. <i>Serpyllum</i> (Mill.) Benth.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces à large amplitude														
	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	.	+	+	+	2	2,2	2	+	+	+	.	V ⁺²
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	.	r	.	2	2	1	.	2	2	.	.	.	III ^{r-2}
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	+	2	+	+	1	.	.	1	+	.	.	III ⁺²
	<i>Rumex acetosa</i> L.	+	.	.	+	+	+	.	.	+	+	+	.	III ⁺
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	+	.	1	.	.	.	2,2	.	.	+	.	2	III ⁺²
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	+	.	+	+	.	+	.	+	.	.	.	.	III ⁺
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	r	r	+	.	.	.	.	+	.	+	.	III ^{r+}
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	+	.	.	+	i	1	.	.	+2	.	III ^{h-1}
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	+	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	+	.	+	.	.	+	.	.	.	II ⁺
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	r	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	II ^{r+}
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	+	+	1	.	.	+	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des landes														
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	+	.	.	.	+	.	r	.	.	+	.	+	III ^{r+}
	<i>Genista anglica</i> L.	.	.	.	.	+	.	1,1	.	.	.	+2	.	II ⁺¹
Espèces compagnes														
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Quercus robur</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Agrostis canina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Stellaria holostea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Galium verum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
F	<i>Crepis biennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
	<i>Galium mollugo</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
Bryophytes														
	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L.Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	I ⁺
	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.	1	.	.	+	.	+	.	.	+	.	1,1	1	III ⁺¹
	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.	2	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	II ⁺²
	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.	+	.	.	.	.	2	.	.	+	.	.	.	II ⁺²
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺