

Dianthus pseudocollini-Meetum athamantici (Luquet 1926) B. Foucault 1986 *nom. mut. nov.* (art. 44, 45)

		14893	34308	658514	14841	14848	14846	393326	407606	658121	14838	14839	14842	14829	14836	14845	14828	SYNTHÈSE
Numéro relevé		1280	1250	1194	1230	1190	1210	1260	1255	1199	1360	1280	1150	1210	1200	1220	1080	1204
Altitude (m)		nd	10	20	nd	nd	nd	nd	1	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	9
Pente relevé (°)		nd	SO	N	nd	nd	nd	nd	E	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition		nd	15	25	nd	nd	nd	15	50	25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	26
Surface (m²)		nd	90	100	nd	nd	nd	100	100	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	98
Recouvrement total (%)		nd	33	43	41	35	51	43	45	30	41	35	42	41	43	44	39	40
Nombre de taxons		40	33	43	41	35	51	43	45	30	41	35	42	41	43	44	39	40
Combinaison caractéristique																		
M	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	2	1,1	2	2	2	+	2,3	2,2	.	.	2	1	2	1	2	1	V ⁺²
	<i>Thymus pulegioides</i> L.	.	2,3	2	2	+	.	2,3	1,2	1	2	2	1	1	2	1	1	V ⁺²
	<i>Genista sagittalis</i> L.	2	1,1	1	2	2	+	2,2	2,2	2	2	2	1	2	2	2	2	V ⁺²
M	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	1	1,1	.	+	.	+	1,2	1,2	.	1	1	+	+	.	.	1	IV ⁺¹
M	<i>Viola lutea</i> Huds.	2	1,1	1	+	.	.	2,2	+	+	1	1	1	+	+	1	1	V ⁺²
	<i>Galium verum</i> L.	2	2,2 cf	2 cf	2	+	1	+2	+2	1 cf	2	2	2	2	2	2	2	V ⁺²
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	+	2,2	1	+	1	+	i	i	r	+	2	1	1	+	.	1	V ⁺²
	<i>Betonica officinalis</i> L.	1	+2	2	1	2	2	.	.	r	.	+	.	.	2	.	1	IV ⁺²
	<i>Polygala vulgaris</i> L.	1	.	+	.	+	1	1,1	+	.	.	.	1	1	+	+	1	IV ⁺¹
	<i>Prunella hastifolia</i> Brot.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	1	.	.	.	2	+	+	III ⁺²
	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	3,3	2	2	.	.	2,3	2,3	.	.	.	.	+	2	.	+	III ⁺³
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles																		
	<i>Nardus stricta</i> L.	2	+	1	3	2	2	2,2	3,3	2	2	3	2	2	1	3	+	V ⁺³
	<i>Briza media</i> L.	2	2,2	+	1	2	1	r	+	+	.	2	2	2	1	1	2	V ⁺²
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	1	.	.	1	.	+	1,1	1,1	.	1	.	1	2	2	1	1	IV ⁺²
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	.	1,1	+	1	.	+	+	1,2	.	1	.	+	1	.	1	.	IV ⁺¹
	<i>Galium saxatile</i> L.	+	+	+	2	.	.	r	.	.	1	.	.	.	.	.	.	II ⁺²
M	<i>Arnica montana</i> L.	1	1,1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	II ^{r+}
	<i>Serratula tinctoria</i> L.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺²
	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres																		
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	1	.	.	+	.	.	+2	+	+	1	+	.	.	+	1	+	IV ⁺¹
	<i>Potentilla verna</i> L.	.	.	1	.	1	.	1,1	2,2	+	.	.	1	+	1	.	+	III ⁺²
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	1	+	1	2	1	.	.	+2	.	.	2	2	.	.	2	.	III ⁺²
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	.	2,2	+	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	2	2	II ⁺²
M	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	II ⁺
M	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	.	.	.	1	.	.	+	r,2	.	.	.	.	+	.	+	+	II ^{r+1}
	<i>Silene nutans</i> L.	.	+	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	.	.	.	+	.	.	+2	+	+ cf	+	.	.	+	.	.	.	II ⁺
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	.	.	+	+	.	.	+	+2	.	1	.	.	.	+	.	.	II ⁺¹
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	I ⁺²
M	<i>Senecio doricnicum</i> (L.) L.	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺²
	<i>Potentilla aurea</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	I ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles																		
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	.	2	1	+	+	1,2	2,3	.	2	.	+	1	.	+	.	IV ⁺²
	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	1	2,2	.	1	.	.	1,1	2,2	1	1	.	.	.	1	+	1	IV ⁺²
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	1	1	1	+	1	1	1	IV ⁺¹
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	.	.	+	.	2	+	.	1,3	r	1	1	2	.	.	1	2	IV ⁺²
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	+	+	.	+	1	2	.	.	.	.	1	.	2	1	.	1	III ⁺²
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	2	.	+	+2	+	1	.	.	1	1	1	.	III ⁺²
	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	1	II ⁺¹
	<i>Galium pumilum</i> Murray	.	+	.	.	+	1	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	II ⁺¹
M	<i>Cerastium arvense</i> L.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	II ⁺
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles																		
	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	.	.	r	.	.	+	1,2	+	.	.	1	1	2	1	2	2	IV ^{r+2}
	<i>Veronica officinalis</i> L.	.	.	.	2	.	.	.	r,2	.	2	.	.	+	.	.	.	II ^{r+2}
M	<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>lanceolata</i> (Lapeyr.) J.-M.Tison	.	1,1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	.	.	r	1	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles																		
M	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	+	1,1	.	1	2	.	1,2	+	.	.	+	.	.	.	+	.	III ⁺²
	<i>Genista tinctoria</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	2	1	.	1	1	1	III ⁺²
	<i>Viola canina</i> L.	1	.	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	II ¹
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	1	.	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	I ¹
	<i>Linum catharticum</i> L.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles																		
	<i>Festuca rubra</i> L.	3	.	.	3	3	2	2,2 cf	+ cf	.	3	+	2	3	3	3	3	V ⁺³
	<i>Stellaria graminea</i> L.	+	.	+	.	.	.	+2	+2	r	.	+	1	.	.	1	+	III ^{r+1}
	<i>Leucanthemum cf. ircutianum</i>	+	.	.	.	1	+	+2	+2	.	+	1	.	+	.	.	.	III ⁺¹
F	<i>Knaulia arvensis</i> (Briq.) Szabó	.	2,2	r cf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
Espèces à large amplitude																		
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	+	+	2	2	r,2	r,2	1	1	2	2	2	2	2	2	V ^{r+2}
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2	1,1	.	2	2	.	1,1	2,2	1	2	2	1	2	2	2	2	V ¹⁺²
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	+	2	1	1	+	1,1	1	1	.	1	1	1	.	2	IV ⁺²
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	.	+	+	+	+	+	+2	.	+	1	.	1	+	+	.	IV ⁺¹
	<i>Achillea millefolium</i> L.	1	+	+	+	.	.	+	r,2	1	1	.	.	1	1	1	.	IV ^{r+1}
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1	.	+	2	.	.	.	+2	1	1	+	.	.	1	2	.	III ⁺²
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	2	2	2	2	2	III ¹⁺²
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	1	1	II ^{r+1}
P	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	.	.	r	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	II ^{r+2}
	<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	r cf	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	II ⁺
Espèces des landes																		
	<i>Genista anglica</i> L.	1	.	.	1	.	.	1,1	2,2	.	+	.	1	1	+	.	+	III ⁺²
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	.	+	+	.	.	.	2,2	2,2	.	.	.	1	.	.	.	.	II ⁺²
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres																		
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	1	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	II ⁺¹
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles																		
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	II ⁺¹

		14689	34308	65814	14641	14648	14646	39326	407606	658121	14638	14639	14642	14629	14636	14645	14628	SYNTHESE
Numéro relevé		1280	1250	1194	1230	1190	1210	1260	1255	1199	1360	1280	1150	1210	1200	1220	1080	1 204
Altitude (m)		nd	10	20	nd	nd	nd	nd	1	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	9
Pente relevé (°)		nd	SO	N	nd	nd	nd	nd		E								
Exposition		nd	15	25	nd	nd	nd	15	50	25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	26
Surface (m²)		nd	90	100	nd	nd	nd	100	100	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	98
Recouvrement total (%)		nd	90	100	nd	nd	nd	100	100	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
Nombre de taxons		40	33	43	41	35	51	43	45	30	41	35	42	41	43	44	39	40
M	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	+	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ^{~2}
Espèces compagnes																		
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ^{~1}
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	1,1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
M	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Dianthus deltoides</i> L.	.	.	r	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ^{r+}
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Festuca arvensis</i> Auquier, Kerguelen & Markgr.-Dann.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Festuca microphylla</i> (St.-Yves) Patzke	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	r	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Centaurea jacea</i> L.	.	.	+	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{~1}
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ^{~1}
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Leontodon hispidus</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Nocca caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
R-	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
M	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Ajuga reptans</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Centaurea nigra</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Knaulia</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ranunculus</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Trochardium verticillatum</i> (L.) Raf.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Veratrum album</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	.	.	.	.	.	.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hoss	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Scorzoneroideae pyrenaica</i> (Gouan) Holub	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Genista pilosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	2,2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^{r-2}
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	1,1	.	.	.	.	.	+	.	.	I ^{~1}
	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
P	<i>Scorzoneroideae autumnalis</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Phleum nodosum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	+	.	.	.	I ^{r+}
	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Gentiana cruciata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	I ^{~1}
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Saxifraga granulata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
M	<i>Trifolium spadiceum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Veronica arvensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Anemone</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	I ¹
	<i>Carex hirta</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
F	<i>Phleum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Scleranthus perennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Koeleria</i> gr. <i>pyramidata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
M	<i>Bellardichloa variegata</i> (Lam.) Kerguelen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹