

Anacamptido morionis-Serapiadetum linguae B. Foucault 1986 *nom. corr.* (art. 44)

		Numéro relevé	551827	551880	584538	551767	586116	598282	598512	598518	640452	640470	640505	662961	SYNTHESE
		Altitude (m)	195	185	180	290	240	202	266	259	214	235	214	nd	225
		Pente relevé (°)	nd	nd	nd	nd	nd	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	15
		Exposition	SO			SO									
		Surface (m²)	8	30	30	30	30	50	50	30	200	20	100	40	52
		Recouvrement total (%)	100	100	100	100	100	95	100	100	100	95	95	100	99
		Nombre de taxons	28	42	38	30	28	35	37	36	32	35	46	41	36
Combinaison caractéristique															
C	<i>Serapias lingua</i> L.		3	1	2	1	2	1	1	1	1	2	+	1	V ⁺³
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		+	+	1	2	1	2 cf	1 cf	2 cf	2	1	1	+	V ⁺²
	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.		1	2	1	+	+	+	2	1	2	1	1	1	V ⁺²
Ci	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.		.	r	+	.	.	.	1	1	2	1	1	2	IV ^{r-2}
C	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.		.	r	.	.	1	+	1	.	.	1	1	.	III ^{r-1}
	<i>Polygala vulgaris</i> L.		.	r	.	2	.	.	1	.	+	.	1	.	III ^{r-2}
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles															
	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.		.	1	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1	V ¹⁻³
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.		.	+	1	+	2	+	1	2	1	1	1	.	V ⁺²
	<i>Prunella vulgaris</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles															
	<i>Lotus corniculatus</i> L.		+	+	2	1	2	.	2	2	1	2	1	1	V ⁺²
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	V ¹⁻²
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.		.	1	2	.	+	1	1	1	1	1	1	+	V ⁺²
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.		.	+	.	1	+	+	1	2	2	.	+	1	IV ⁺²
	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 cf	1 cf	+	II ⁺¹
	<i>Leontodon hispidus</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	I ²⁻³
	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.		.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Scabiosa columbaria</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à moyennement fertiles															
	<i>Myosotis dubia</i> Arrond.		r	.	1	.	+	.	1	+	1	+	1	.	IV ^{r-1}
Ci	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinieri</i> (Balb. ex Hornem.) DC.		.	+	+	r	.	1	.	.	1	.	.	.	III ^{r-1}
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles															
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.		.	r	+	+	.	.	1	1	.	1	1	+	IV ^{r-1}
	<i>Saxifraga granulata</i> L.		1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	II ¹
	<i>Rhinanthus minor</i> L.		+	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	1	II ⁺²
	<i>Galium verum</i> L.		.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺²
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles															
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.		2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	+	V ⁺³
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.		2	+	2	2	3	2	2	1	.	1	1	+	V ⁺³
	<i>Briza media</i> L.		2	1	1	2	.	.	2	1	+	1	1	2	V ⁺²
	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.		+	+	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	II ^{r+}
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles															
C	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		.	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	II ¹⁻³
	<i>Betonica officinalis</i> L.		.	.	2	1	2	.	.	.	.	.	+	.	II ⁺²
	<i>Carex flacca</i> Schreb.		1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II ⁺¹
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres															
	<i>Succisa pratensis</i> Moench		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West		.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺¹
C	<i>Plantago media</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles															
	<i>Festuca rubra</i> L.		2 cf	3 cf	3 cf	3 cf	3 cf	3 cf	3 cf	3 cf	3 cf	2 cf	3 cf	3	V ²⁻³
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill.		.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres															
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.		1	1	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Rumex acetosella</i> L.		.	+	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.		.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	1	.	II ⁺¹
	<i>Thymus pulegioides</i> L.		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Trifolium striatum</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles															
	<i>Vicia angustifolia</i> L.		+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	1	.	III ⁺¹
	<i>Ononis spinosa</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	I ⁺¹
Espèces à large amplitude															
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		1	2	2	3	2	1	2	1	2	1	1	.	V ¹⁻³
	<i>Plantago lanceolata</i> L.		2	+	1	+	+	2	+	1	1	1	1	.	V ⁺²

	Numéro relevé												SYNTHESE
	551827	551880	584538	551767	586116	598282	598512	598518	640452	640470	640505	662961	
	195	185	180	290	240	202	266	259	214	235	214	nd	225
Altitude (m)	nd	nd	nd	nd	nd	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	15
Pente relevé (°)													
Exposition			SO			SO							
Surface (m²)	8	30	30	30	30	50	50	30	200	20	100	40	52
Recouvrement total (%)	100	100	100	100	100	95	100	100	100	95	95	100	99
Nombre de taxons	28	42	38	30	28	35	37	36	32	35	46	41	36
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	1	+	1	r	+	+	+	+	1	1	2	1	V ⁺²
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+	+	2	+	+	1	+	+	1	1	1	1	V ⁺²
<i>Trifolium pratense</i> L.	+	+	1	+	+	.	1	1	1	1	1	2	V ⁺²
<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	V ⁺¹
<i>Rumex acetosa</i> L.	.	+	+	.	+	+	+	1	1	+	+	1	V ⁺¹
<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	2	+	2	2	2	2	3	1	1	IV ⁺³
<i>Agrostis capillaris</i> L.	.	3	2	.	1	2	2	2	2	.	1	1	IV ¹⁻³
P <i>Cynosurus cristatus</i> L.	.	.	+	.	.	.	1	1	+	1	.	2	III ⁺²
<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	+	+ cf	.	.	.	+	+	.	1	1	.	III ⁺¹
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	+	.	1	.	.	.	+	.	1 cf	.	.	+	III ⁺¹
F <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	+	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	II ⁺
<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	1	1	II ⁺¹
F <i>Lathyrus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1	1	II ⁺¹
P++ <i>Bellis perennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	II ⁺
<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	2	II ⁺²
Espèces annuelles													
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	+	+	.	+	.	.	+	+	1	.	+	.	III ⁺¹
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	+	+	III ⁺
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	.	II ¹⁻²
<i>Aira multiculmis</i> Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
<i>Aira caryophyllea</i> L.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	I ¹⁻²
Autres taxons													
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	I ¹
Espèces compagnes													
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Sedum rupestre</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Centaurea</i> subgen. <i>Jacea</i> (Mill.) Hayek	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Stellaria graminea</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Erica cinerea</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Potentilla verna</i> L.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
P- <i>Holcus mollis</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	I ⁺
<i>Ajuga reptans</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Quercus robur</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
<i>Scorzonera humilis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
<i>Linum catharticum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Medicago lupulina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	I ^r
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺