

Galio saxatilis-Festucetum filiformis Rasch ex Stieperaere 1969 *nom. corr.* (art. 44)

	14957	14962	236191	218316	255476	338850	338858	384351	447333	605039	650727	365093	368147	389018	SYNTHESE
Numéro relevé															
Altitude (m)	900	900	1 020	950	900	680	815	1 120	910	799	nd	740	660	835	864
Pente relevé (°)	10	2	nd	nd	2	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3	nd	4
Exposition	S	O			NE	NO							N		
Surface (m²)	20	40	10	10	300	100	150	nd	5	18	15	100	60	30	66
Recouvrement total (%)	nd	nd	100	100	95	95	100	nd	100	98	95	100	100	100	98
Nombre de taxons	11	16	16	19	21	25	27	24	16	25	23	25	27	23	21
Combinaison caractéristique															
<i>Nardus stricta</i> L.	3,2	.	1,2	4,4	+2	3,3	r	1,2	2,2	2	.	3,3	3,3	3,3	V ^{r-4}
<i>Galium saxatile</i> L.	1,2	2,2	2,2	3,3	3,3	2,3	2,2	1	3,3	1	1	2,3	2,2	2,2	V ¹⁻³
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	+2	+2	.	1,1	3,3	2,2	2,2	.	3,4	+	.	.	2,2	1,2	IV ⁺³
<i>Carex pilulifera</i> L.	.	+2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	.	.	2	1	.	+1	1,1	IV ⁺²
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	.	.	.	.	r,2	+2	.	+	.	+	.	.	+1	+1	III ^{r+}
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	.	.	.	2,2	1,2	1,1	r	+	1,1	1	.	.	2,2	.	III ^{r-2}
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2,2	1,1	1,1	II ¹⁻²
<i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	r	I ^{r+}
<i>Scorzonera humilis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+1	.	.	I ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres															
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	1,1	1,1	2,2	+	r	2,2	1,1	1,2	+	1	1	1,2	2,2	1,1	V ^{r-2}
<i>Rumex acetosella</i> L.	.	.	.	.	+	1,3	+2	.	+	+	1	.	.	.	III ^{r+1}
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	.	+	+	.	.	1,2	r	1	.	.	.	.	1,1	.	III ^{r-1}
<i>Jasione laevis</i> Lam.	.	.	.	.	.	1,1	r	+	.	.	.	.	+1	.	II ^{r-1}
<i>Festuca gr. ovina</i>	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	I ¹⁻²
<i>Thymus pulegioides</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles															
<i>Festuca rubra</i> L.	2,2	2,3	3,3 cf	1,1	2,2 cf	3,3 cf	3,3	.	.	.	.	.	2,2	1,1	IV ¹⁻³
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	1,2	+1	.	II ^{r+1}
<i>Stellaria graminea</i> L.	+2	.	.	r	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	II ^{r-1}
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles															
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	.	1,2	+	.	.	2,2	+1	.	+	1	2	2,2	1,1	.	IV ⁺²
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	.	1,1	+	1,1	2,2	2,2	.	+	+	+	.	.	.	2,2	IV ⁺²
<i>Veronica officinalis</i> L.	.	.	.	1,1	r,2	1,2	1,1	1	.	+	1	1,2	1,1	+2	IV ^{r-1}
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	.	.	.	.	.	.	.	3	3,4	.	.	3,3	.	2,2	II ²⁻³
<i>Briza media</i> L.	.	.	.	.	.	+1	.	.	.	.	.	2,2	.	+1	II ⁺²
M <i>Arnica montana</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des landes															
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	.	2,2	+	.	+	+3	+2	.	.	2	2	.	+1	1,2	IV ⁺²
<i>Genista anglica</i> L.	.	1,2	.	r	.	1,2	+1	.	.	.	.	+1	.	+1	III ^{r-1}
<i>Genista pilosa</i> L.	.	1,2	+	.	1,1	+1	.	.	.	2	.	.	.	.	II ⁺²
<i>Ulex minor</i> Roth	.	.	.	.	.	+3	2,3	.	.	1	.	.	+1	2,2	II ⁺²
<i>Erica cinerea</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	3	3	.	.	.	II ¹⁻³
<i>Erica tetralix</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles															
<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	.	+2	.	.	2,3	1,2	1	.	1	.	.	+1	.	III ⁺²
<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	I ^{r+}
M <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	I ²
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles															
P- <i>Holcus mollis</i> L.	1,1	.	.	.	.	+2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	I ^{r+1}
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹⁻¹
R- <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles															
M <i>Centaurea nigra</i> L.	.	.	i	.	.	.	.	1	+2	.	.	.	.	.	II ¹⁻¹
<i>Viola canina</i> L.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	I ⁺²
M <i>Meum athamanticum</i> Jacq.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres															
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+1	+1	II ⁺¹
<i>Trochardis verticillatum</i> (L.) Raf.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	r	.	I ^{r+}
<i>Carex panicea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	I ²
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles															
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I ⁺
<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹
M <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	I ¹
Espèces à large amplitude															

		14957	14962	236191	218316	255476	338850	338858	384351	447333	605039	650727	365093	368147	389018	SYNTHESE
Numéro relevé																
Altitude (m)		900	900	1 020	950	900	680	815	1 120	910	799	nd	740	660	835	864
Pente relevé (°)		10	2	nd	nd	2	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	3	nd	4
Exposition		S	O			NE	NO							N		
Surface (m²)		20	40	10	10	300	100	150	nd	5	18	15	100	60	30	66
Recouvrement total (%)		nd	nd	100	100	95	95	100	nd	100	98	95	100	100	100	98
Nombre de taxons		11	16	16	19	21	25	27	24	16	25	23	25	27	23	21
<i>Agrostis capillaris</i> L.		2,2	1,2	2,2	1,1	1,2	2,2	2,2	1	+	1	.	.	2,2	1,1	V ⁺ 2
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		.	.	+	.	.	.	r	.	.	.	1	1,1	2,2	1,1	III ^{r-2}
<i>Holcus lanatus</i> L.		.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	3,3	2,2	2,2	II ^{r-3}
<i>Hypochaeris radicata</i> L.		.	.	.	.	i	.	+1	.	.	+	.	r	.	.	II ^{r+}
<i>Achillea millefolium</i> L.		.	.	.	.	.	+1	+1	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.		.	.	.	.	+2	.	.	+	.	+	.	.	.	.	II ⁺
<i>Poa pratensis</i> L.		.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces forestières																
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		i	+2	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+1	.	II ^{r+}
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn		.	.	.	.	.	.	3,3	.	.	.	.	.	+1	.	I ⁺ 3
Espèces compagnes																
<i>Viola riviniana</i> Rchb.		.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Juniperus communis</i> L.		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Ilex aquifolium</i> L.		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Trifolium repens</i> L.		.	.	.	.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.		.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	.	.	.	.	.	+3	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.		.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret		.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.		.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.		.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Cuscuta</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	I ⁺
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.		.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	I ^r
<i>Frangula alnus</i> Mill.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	I ^r
<i>Rumex acetosa</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I ⁺
<i>Ranunculus acris</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I ⁺
<i>Rubus</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	I ⁺
<i>Pilosella lactucella</i> (Waltr.) P.D.Sell & C.West		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I ⁺
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	.	I ⁺
<i>Galium</i> gr. <i>palustre</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
<i>Ajuga reptans</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
<i>Leucanthemum</i> cf. <i>ircutianum</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
<i>Betonica officinalis</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	.	I ⁺
<i>Carex</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I ^r
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+1	I ⁺
Bryophytes																
<i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.		+2	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺