

Ranunculo sardoi-Caricetum melanostachyae Culat ass. prov.

		488231	488232	488233	488229	500303	488230	559997	SYNTHESE
Numéro relevé									
Altitude (m)		357	350	350	348	355	348	167	325
Pente relevé (°)		0	0	0	0	0	0	0	0
Exposition									
Surface (m²)		20	30	25	35	25	30	5	24
Recouvrement total (%)		100	100	100	100	85	100	90	96
Nombre de taxons		29	20	16	14	30	20	12	20
Combinaison caractéristique									
C	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	+	2,3	.	.	1,1	.	.	II ⁺ -2
	<i>Carex melanostachya</i> M.Bieb. ex Willd.	4,4	3,3	3,3	2,3	2,2	.	4	IV ⁺ -4
	<i>Euphorbia stricta</i> L.	1,1	.	.	i	.	+	.	II ⁺ -1
	<i>Carex divisa</i> Huds.	.	.	1,1	+3	+	.	.	II ⁺ -1
	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	+	.	1,1	.	.	+	.	II ⁺ -1
C	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	3,3	.	.	.	.	.	.	I ³
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles									
	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	.	+	.	3,3	.	2,2	.	III ⁺ -3
	<i>Vicia gr. sativa</i>	.	3,3	2,2	r	i	+	.	IV ⁱ -3
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles									
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	.	+	.	3,3	.	II ⁺ -3
	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	.	.	.	.	.	r,3	.	I ^r
Espèces des milieux sains à humides, peu fertiles à moyennement fertiles									
	<i>Carex spicata</i> Huds.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Festuca gr. rubra</i>	.	.	.	.	.	2,2	.	I ²
Espèces des milieux sains à humides fertiles									
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	1,1	3,3	1,1	4,4	.	i	r	IV ^r -4
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	1,1	+	.	1,1	r	2,2	.	IV ^r -2
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	i	.	.	r	i	+	.	III ⁱ +
	<i>Poa trivialis</i> L.	.	.	.	.	1,2	.	2	II ¹ -2
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à moyennement fertiles									
P++	<i>Carex tomentosa</i> L.	.	.	1,1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Bromus racemosus</i> L.	.	.	.	.	+3	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles									
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	+	.	2,2	.	.	+	+	III ⁺ -2
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles									
C	<i>Carex otrubae</i> Podp.	i	r	.	.	.	.	.	II ^r -1
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	.	.	.	.	1,3	.	.	I ¹
	<i>Iris pseudacorus</i> L.	.	.	.	.	.	.	i	I ⁱ
Espèces à large amplitude									
	<i>Poa pratensis</i> L.	+	4,4	3,3	2,2	+	1,2	.	IV ⁺ -4
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	+	1,2	3,3	.	4,4	+	1	IV ⁺ -4
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	i	r	+	i	1,1	+	.	IV ^r -1
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	i	.	2,2	+	1,1	+	.	IV ⁱ -2
	<i>Galium mollugo</i> L.	2,2	.	.	+	.	.	.	II ⁺ -2
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	1,2	+	.	.	.	.	II ⁺ -1
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	r	.	+	.	1	II ^r -1
	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	.	.	.	.	.	i	II ⁺ +
Espèces annuelles									
	<i>Geranium dissectum</i> L.	1,1	+	+	.	.	.	r	III ^r -1
	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	r	.	.	.	.	.	II ^r +
	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	.	+	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Veronica arvensis</i> L.	.	i	i	.	.	.	.	II ⁱ
	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
Autres taxons									
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	r	.	.	.	i	+	.	II ^r +
	<i>Galium aparine</i> L.	1,1	.	.	.	.	.	1	II ¹
	<i>Conium maculatum</i> L.	1,3	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Allium oleraceum</i> L.	r,3	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f.	r,3	.	.	.	.	.	.	I ^r
	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Galega officinalis</i> L.	1,1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Ranunculus acris</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Draba verna</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Lactuca scariola</i> L.	.	.	.	i	.	.	.	I ⁱ
	<i>Festuca pulchra</i> Schur	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	I ¹
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	.	+3	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	.	2,2	.	.	I ²
P	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
P++	<i>Bellis perennis</i> L.	.	.	.	.	+3	.	.	I ⁺
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	.	.	.	.	.	1,2	.	I ¹
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	.	.	+3	.	I ⁺
	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip.	.	.	.	.	.	i	.	I ⁱ
P	<i>Lolium perenne</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Rubus fruticosus</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Rumex</i> L.	+	r	.	.	.	.	.	II ^r +
	<i>Prunus spinosa</i> L.	i	.	.	.	+	.	.	II ⁱ +