

Loto glaberi-Agrostietum stoloniferae Culat ass. nov.

		483012	482760	482731	482874	504442	SYNTHESE
Numéro relevé							
Altitude (m)		162	160	165	157	285	186
Pente relevé (°)		0	0	0	5	0	1
Exposition					N		
Surface (m²)		4	10	8	2	10	7
Recouvrement total (%)		100	100	95	80	98	95
Nombre de taxons		18	18	21	11	15	17
Combinaison caractéristique							
C	<i>Lotus glaber</i> Mill.	2,2	1,2	+	.	.	III ⁺²
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	5,5	4,4	4,4	2,2	4,4	V ²⁻⁵
	<i>Potentilla reptans</i> L.	2,2	2,2	3,3	r,3	3,3	V ^{r-3}
	<i>Trifolium repens</i> L.	2,2	3,3	1,2	2,2	.	IV ¹⁻³
	<i>Carex hirta</i> L.	+3	+3	.	.	.	II ⁺
C	<i>Juncus articulatus</i> L.	.	.	+3	4,4	.	II ⁺⁴
Espèces à large amplitude							
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	+	+	.	+	III ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	+	.	r,3	.	+	III ^{r+}
P+	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L.	1,1	.	1,2	.	.	II ¹
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	+3	.	+	.	.	II ⁺
	<i>Daucus carota</i> L.	+	.	.	.	r	II ^{r+}
Espèces des friches							
	<i>Symphyotrichum</i> gr. <i>novi-belgii</i>	+	2,2	1,1	.	.	III ⁺²
	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	.	i	1,1	.	.	II ⁱ⁻¹
	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	+	.	+	.	.	II ⁺
	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	.	.	.	1,1	II ⁺¹
	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	.	.	+	.	1,2	II ⁺¹
	<i>Picris hieracioides</i> L.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	.	.	i	.	.	I ⁱ
P+	<i>Polygonum aviculare</i> L.	.	.	+3	.	.	I ⁺
	<i>Solidago canadensis</i> L.	.	.	.	r	.	I ^r
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles							
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	i	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	.	1,2	.	.	.	I ¹
	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	.	+3	.	.	.	I ⁺
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	.	i	.	.	.	I ⁱ
C	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	.	.	.	.	1,2	I ¹
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	2,2	I ²
	<i>Dianthus armeria</i> L.	.	.	.	.	r	I ^r
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles							
C	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	i	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Festuca rubra</i> L.	.	2,2	.	.	.	I ²
Autres taxons							
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	1,2	.	.	.	.	I ¹
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	i	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Geranium columbinum</i> L.	i	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	+3	.	.	.	I ⁺
	<i>Medicago lupulina</i> L.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	+3	.	.	I ⁺
	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov	.	.	r	.	.	I ^r
P+	<i>Poa annua</i> L.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Juncus bufonius</i> L.	.	.	.	1,2	.	I ¹
	<i>Cyperus fuscus</i> L.	.	.	.	+3	.	I ⁺
	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	.	i	I ⁱ
	<i>Populus nigra</i> L.	.	.	i	i	+	III ⁱ⁺
	<i>Carex</i> L.	1,2	.	.	+	.	II ⁺¹
	<i>Trifolium</i> L.	.	r	.	.	+	II ^{r+}
	<i>Rubus</i> L.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Rumex</i> L.	.	.	+	.	.	I ⁺
	Bryophytes	.	.	3,3	.	3,3	II ³