

Geranio pyrenaici-Trisetetum flavescentis

ass. nov.

Numéro relevé		571950	572821	573021	573167	573169	573170	573171	573516	573517	573518	573574	573576	SYNTHESE
Altitude (m)		985	990	795	1012	996	995	997	1043	1049	1019	937	900	977
Pente relevé (°)		5	10	5	30	10	15	15	25	25	20	20	35	18
Exposition		SE	SE	NE	SO	E	S	S	SE	SE	S	NE	SE	
Surface (m²)		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	nd	25
Recouvrement total (%)		80	80	70	80	90	90	90	90	95	95	90	nd	86
Nombre de taxons		25	23	22	25	27	22	22	21	23	22	18	26	23
Combinaison caractéristique														
M	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	+	1,1	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	1,1	.	1,1	1,1	1,1	V ⁺²
	<i>Poa trivialis</i> L.	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	.	2,2	2,2	V ¹⁻²
	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	r	.	.	r	.	.	.	2,2	2,2	.	+	1,1	III ^{r-2}
	<i>Capsella cf bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	1,1	1,1	+	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	.	+	1,1	V ⁺²
P	<i>Lolium perenne</i> L.	2,2	3,3	2,2	3,3	2,2	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2	V ²⁻³
	<i>Trifolium repens</i> L.	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	3,3	2,2	2,2	3,3	.	2,2	V ²⁻³
	<i>Trifolium pratense</i> L.	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,2	1,1	.	1,1	V ¹⁻²
P+	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	.	1,1	1,1	+3	.	1,1	.	1,1	2,2	+	.	.	III ⁺²
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	3,3	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,1	+	.	1,1	1,1	V ⁺³
	<i>Veronica arvensis</i> L.	.	1,1	.	.	.	.	.	1,1	2,2	1,1	.	.	II ¹⁻²
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	2,2	2,2	3,3	3,3	.	2,2	2,2	3,3	3,3	2,2	2,2	1,1	V ¹⁻³
	<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	3,3	2,2	2,2	.	.	.	.	1,1	.	3,3	II ¹⁻³
P+	<i>Plantago major</i> L.	1,1	.	.	1,1	.	1,1	.	.	+	.	1,1	1,1	III ⁺¹
	<i>Trisetum flavescentis</i> (L.) P.Beauv.	.	.	1,1	.	1,1	.	1,1	.	1,1	.	1,1	+	III ⁺¹
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	2,2	+3	1,1	+	1,1	.	+	.	.	+	+	.	IV ⁺²
	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	1,1	1,1	.	1,1	1,1	1,1	1,1	.	.	.	.	1,1	III ¹
	<i>Festuca rubra</i> L.	2,2	1,1	1,1	.	2,2	1,1	1,1	+3	r	1,1	.	.	IV ^{r-2}
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	3,3	2,2	.	II ¹⁻³
	<i>Ranunculus acris</i> L.	1,1	.	+	1,1	1,1	.	.	1,1	+	+	.	.	III ⁺¹
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	.	1,1	.	.	.	1,1	+	1,1	.	.	2,2	2,2	III ⁺²
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles														
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	1,1	1,1	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	.	II ¹
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	.	.	.	.	1,1	.	1,1	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles														
M	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	.	.	+	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Leucanthemum cf ircutianum</i> DC.	.	r,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ^{r+}
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles														
P	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	1,1	I ¹
	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	.	.	1,1	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
F	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Carex spicata</i> Huds.	.	.	.	1,1	+	r	+	.	.	.	.	.	II ^{r-1}
Espèces des milieux sains à humides fertiles														
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I ^r
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,2	1,1	I ¹⁻²
	<i>Rumex crispus</i> L.	.	.	.	.	1,1	1,1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	.	I ⁺¹
	<i>Urtica dioica</i> L.	.	.	r,3	.	.	1,3	.	1,3	.	.	2,2	+3	II ^{r-2}
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	.	.	+	.	.	2,2	.	.	+	.	1,1	1,1	II ⁺²
Espèces à large amplitude														
	<i>Achillea millefolium</i> L.	+	+	1,1	2,2	.	.	1,1	2,2	2,2	2,2	.	.	IV ⁺²
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	.	.	.	2,2	2,2	.	.	2,2	+	2,2	.	1,1	III ⁺²
F	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	I ^r
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	2,2	2,2	1,1	+	1,1	+	1,1	1,1	+	1,1	+	+	V ⁺²
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	2,2	.	1,1	1,1	1,1	2,2	.	1,1	1,1	.	.	III ¹⁻²
	<i>Rumex acetosa</i> L.	+	1,1	.	1,1	1,1	.	.	1,1	+	1,1	.	.	III ⁺¹
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	2,2	.	.	1,1	2,2	.	1,1	.	2,2	1,1	.	1,1	III ¹⁻²
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1,2	2,2	1,1	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	II ¹⁻²
P	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	1,1	I ¹
	<i>Poa pratensis</i> L.	3,3	.	.	1,1	.	.	1,1	.	1,1	1,1	.	.	II ¹⁻³
Autres taxons														
	<i>Ranunculus repens</i> L.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Alchemilla</i> gr. <i>vulgaris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1	I ¹
	<i>Viola tricolor</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
Espèces annuelles														
	<i>Geranium dissectum</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1,1	I ⁺¹
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	i	.	.	+	.	1,1	.	+	.	.	.	.	II ¹⁻¹
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	.	.	.	.	+	1,1	.	1,1	.	+	.	.	II ⁺¹
	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺